

DOLORE DNC AGGIORNAMENTI CLINICI





Dal 1976 impegnata nello studio e nella cura del dolore



ORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE
ITALIANA PER LO STUDIO DEL DOLORE

N. 3/2025 - Online: novembre 2025

Comitato scientifico: il Consiglio Direttivo AISD

Direttore responsabile: Giustino Varrassi

Coordinamento editoriale: Lorenza Saini

Grafica e impaginazione: Osvaldo Saverino

Trimestrale

Prima Reg. Trib. dell'Aquila n. 335/97

Seconda Reg. Trib. dell'Aquila n. 571 del 18/12/2007

Associazione Italiana Studio del Dolore

Sede legale: Via Tacito, 7 - 00193 Roma

info@aisd.it - www.aisd.it

© Copyright 2025 Associazione Italiana Studio del Dolore

05 **Dall'European Journal of Pain**

Musica scelta autonomamente come contributo all'analgesia indotta dalla musica in diversi contesti socio-culturali: uno studio crossover randomizzato e controllato

ANTONIA S. BECKER, EMILIE S. VAN DER VALK BOUMAN, JULIAN SCHAAP, KOEN VAN EIJCK, ZAHRA BIERMAN, CHARLOTTE SAAT, HANS JEEKEL, CECILE C. DE VOS, MARKUS KLIMEK

21 **48° Congresso nazionale AISD**

Un evento che mette al centro ricerca, innovazione e collaborazione multidisciplinare

31 **Abstract premiati**

32 **50° Anniversario del Primo Congresso IASP: Pain Medicine. A long journey**

Mezzo secolo di medicina del dolore: dalla biologia molecolare all'intelligenza artificiale

34 **Le riflessioni di un partecipante al Congresso IASP 1975 e al Congresso del Cinquantennale**

MARCO MARESCA

38 **10 ottobre Giornata mondiale della salute mentale: Comorbidità tra dolore cronico e disturbi mentali**

40 **15 ottobre 2025 Giornata europea per la consapevolezza del dolore 2025: La prevenzione del dolore cronico**

43 **Calendario eventi**

44 **Area risorse educative**

49

CONGRESSO
NAZIONALE

AISD

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER LO STUDIO DEL DOLORE

[SAVE THE DATE]

Aci Castello

CATANIA

1-3 OTTOBRE 2026



SEDE CONGRESSO: Four Points by Sheraton Hotel

PLANNING

SEGRETERIA SCIENTIFICA: AISD Associazione Italiana per lo studio del dolore ETS

PROVIDER ECM E AGENZIA ORGANIZZATIVA: Planning Congressi Srl

Project Manager: Ramona Cantelli - r.cantelli@planning.it

Contatti sponsor: Cristina Uzzo - c.uzzo@planning.it

www.aisd.it



AISD

f in y i

Musica scelta autonomamente come contributo all'analgesia indotta dalla musica in diversi contesti socio-culturali: uno studio crossover randomizzato e controllato

Antonia S. Becker¹ | Emilie S. van der Valk Bouman¹ | Julian Schaap² | Koen van Eijck² | Zahra Bierman¹ | Charlotte Saat¹ | Hans Jeekel^{†1} | Cecile C. de Vos³ | Markus Klimek⁴

¹Department of Neuroscience, Erasmus Medical Center, Rotterdam, the Netherlands | ²Department of Arts and Culture Studies, Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands | ³Centre for Pain Medicine, Erasmus Medical Centre, Rotterdam, the Netherlands | ⁴Department of Anesthesiology, Erasmus Medical Center Rotterdam, Rotterdam, the Netherlands

Autore corrispondente: Emilie S. van der Valk Bouman (e.vandervalkbouman@erasmusmc.nl)

Ricevuto: 7 Aprile 2025 | **Rivisto:** 21 Luglio 2025 | **Accettato:** 25 Luglio 2025

Finanziamenti: Questo studio è stato sponsorizzato dalla Erasmus MC Foundation. Il periodo di ricerca di J.S. è stato finanziato da Netherlands Organisation for Scientific Research a (progetto NWO #VI.Veni.211S.116).

I finanziatori non hanno avuto alcun ruolo nella progettazione dello studio né nell'analisi e nell'interpretazione dei dati. Tutti gli autori e le rispettive istituzioni si riservano la libertà intellettuale nei confronti dei finanziatori

Parole chiave: variabilità della frequenza cardiaca | musica | analgesia indotta dalla musica | dolore | contesto socio-culturale.

ABSTRACT

Background: L'analgesia indotta dalla musica (MIA) è stata ampiamente studiata, ma il ruolo del contesto socio-culturale, che plasma le preferenze e le percezioni musicali rimane inesplorato. Questo studio indaga se l'effetto della musica preferita sulla durata del dolore rimanga costante nei diversi contesti socio-culturali.

Metodi: In uno studio crossover randomizzato e controllato (n=84) i partecipanti sono stati sottoposti a tre interventi sonori in sequenza causale. Musica scelta autonomamente, musica scelta dai ricercatori (musica classica) ed un podcast come controllo. Dopo 20 minuti è stata testata la resistenza al dolore aumentando progressivamente stimoli elettrici mentre i partecipanti continuavano ad ascoltare. Inoltre, sono stati misurati: la soglia al dolore, i punteggi del dolore percepito, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e le emozioni.

Risultati: Rispetto alla condizione di controllo la musica scelta autonomamente ha aumentato significativamente la resistenza al dolore ($\beta=0,74$, $p=0,003$) ed ha ridotto l'intensità del dolore ($\beta=-0,43$, $p<0,001$) e la spiacevolezza ($\beta=-0,38$, $p=0,007$). Sia la musica scelta autonomamente ($\beta=0,32$, $p=0,034$) sia quella scelta dai ricercatori ($\beta=0,37$, $p=0,018$) hanno aumentato la soglia del dolore rispetto alla condizione di controllo. Queste misurazioni del dolore non sono state influenzate dal contesto socio-culturale dei partecipanti (patrimonio culturale, livello di istruzione). L'analisi dell'HRV ha rivelato una maggiore attività parasimpatica con la musica scelta dai ricercatori ed una frequenza cardiaca più elevata con la musica scelta autonomamente rispetto all'intervento di controllo.

Conclusioni: Ascoltare musica scelta autonomamente è risultato efficace nell'ambito della MIA, indipendentemente dal contesto socio-culturale o dal tipo di musica. Al contrario, la musica scelta dai ricercatori (classica) è risultata più efficace nell'aumentare l'attività parasimpatica. Questo studio evidenzia che la musica auto-selezionata, in linea con le preferenze personali, è efficace per il sollievo dal dolore, incoraggiando approcci personalizzati nell'ambito della MIA.

Dichiarazione di rilevanza: Questo studio ha rivelato che la musica scelta autonomamente aumenta significativamente la resistenza al dolore e riduce i punteggi soggettivi del dolore, indipendentemente dal contesto socio-culturale e dal tipo di musica. Al contrario la musica scelta dai ricercatori (la musica classica) aumenta l'attività parasimpatica, indicando una condizione più rilassata. Questi risultati suggeriscono che diversi tipi di musica possono avere funzioni differenti, con la scelta autonoma della musica particolarmente efficace per il sollievo dal dolore. Incoraggiare i pazienti a scegliere autonomamente la propria musica potrebbe migliorare i risultati della gestione del dolore, sottolineando l'importanza di approcci personalizzati nell'uso della musica finalizzata al sollievo del dolore.

Antonia S. Becker and Emilie S. van der Valk Bouman contributed equally.

† In loving memory of Hans Jeekel, who passed away on July 25, 2025.

This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2025 The Author(s). European Journal of Pain published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of European Pain Federation - EFIC®.

1 | Introduzione

La capacità della musica di influenzare la percezione del dolore, nota anche come analgesia indotta dalla musica (MIA), è stata sempre più oggetto di studio negli ultimi anni. In medicina studi randomizzati controllati e meta-analisi hanno dimostrato che gli interventi musicali possono ridurre il dolore, l'ansia, le risposte allo stress ed il fabbisogno di oppioidi in vari contesti sanitari (Fu et al. 2020; Hole et al. 2015; Kakar et al. 2021; Kuhlmann et al. 2018; Lee 2016; Song et al. 2024; Umbrello et al. 2019). Tuttavia sia gli studi sperimentali che quelli clinici mostrano un'elevata eterogeneità riguardo alla selezione musicale, alle caratteristiche della musica ed al background dei partecipanti. Al momento non esiste un consenso sul tipo di musica più efficace per scopi scientifici e gruppi di pazienti.

Studi sperimentali precedenti indicano che selezionare autonomamente la musica in linea con le preferenze individuali è più efficace nell'ambito della MIA (Basinski et al. 2021; Howlin e Rooney 2021; Valevicius et al. 2023; Van der Valk Bouman et al. 2024). Tuttavia gli studi clinici utilizzano spesso musica selezionata dal ricercatore, con un'attenzione predominante per la musica classica occidentale (Hole et al. 2015; Kuhlmann et al. 2018). Sebbene i meccanismi neurobiologici alla base della MIA non siano ancora completamente compresi, fattori come i cambiamenti nelle emozioni e nell'assetto cognitivo, le idee individuali ed il sistema nervoso autonomo potrebbero costituire la base dell'efficacia della musica (auto-selezionata) (Koelsche e Jancke 2015; Lunde et al. 2019; Vuust et al. 2022). Confronti diretti tra diversi tipi di musica, come quella scelta autonomamente e quella scelta dai ricercatori, con condizioni di controllo adeguate ed una considerazione dei meccanismi sottostanti rimangono rari.

Inoltre la maggior parte degli studi sperimentali sulla MIA è stata condotta in paesi occidentali con partecipanti prevalentemente con un alto livello di istruzione, sollevando dubbi sulla generalizzazione di risultati precedenti riferiti a popolazioni più diversificate (Lee 2016).

La ricerca medica indica un ruolo cruciale dello stato socioeconomico e del contesto culturale nella percezione e nella gestione del dolore (Fillingim 2017;

Meints et al. 2019, 2016). Inoltre studi precedenti hanno dimostrato che caratteristiche personali come genere, etnia, stato sociale valori individuali contribuiscono alle differenze nelle preferenze e nelle percezioni musicali che a loro volta potrebbero influenzare la MIA (Bourdieu 1984; Cowen et al. 2020; Ter Bogt et al. 2011). Ad esempio, il capitale culturale agisce come un fattore chiave nella formazione del gusto musicale, modellando di conseguenza l'esperienza di ascolto individuale (Jaeger e Møllegaard 2022; Van Eijck 2001). Il capitale culturale si riferisce alle risorse culturali, non finanziarie, che un individuo possiede, che in genere vengono trasmesse sin dall'infanzia e sono quindi fortemente influenzate dal contesto socio-culturale dei genitori (Jaeger e Breen 2016; Van der Waal et al. 2024). Tipicamente, livelli più alti di capitale culturale tendono ad implicare un maggiore apprezzamento per generi "di alta cultura", come la musica classica ed il Jazz (Lizardo e Skiles 2016). Inoltre il contesto o la situazione può influenzare il tipo di musica che le persone e scelgono (Sonnett 2020). Pertanto studiare la MIA tra persone provenienti da diversi contesti socio-culturali potrebbe permetterci di utilizzare la musica in ambito sanitario in modo più efficace, riflettendo la diversità reale della popolazione dei pazienti.

Ad oggi, nessuna ricerca ha valutato l'influenza del contesto socio-culturale e del capitale culturale della MIA. Per colmare questa lacuna, abbiamo progettato uno studio crossover randomizzato e controllato per indagare se l'effetto della musica (auto-selezionata sulla resistenza al dolore rimanga consistente in diversi contesti socio-culturali

Per esplorare questa tematica, proponiamo due ipotesi. Primo ipotizziamo che l'impatto positivo della musica scelta autonomamente e preferita nella MIA sia coerente indipendentemente dal contesto socio-culturale. Secondo, ed in contrasto, ipotizziamo che la musica scelta dai ricercatori (classica) abbia un effetto benefico universale sulla MIA.

2 | Metodi

2.1 | Disegno dello studio

Lo studio MOSART è uno studio crossover randomizzato controllato da Agosto 2023 a novembre

2024 presso l'ambulatorio del Centro di Medicina del Dolore dell'Erasmus Medical Center di Rotterdam, Paesi Bassi. Il protocollo è stato approvato dal Comitato Etico dell'Erasmus MC (MEC-2023-0253) ed è stato preregistrato su www.clinicaltrials.gov (NCT06008951). Il protocollo pubblicato fornisce ulteriori informazioni sul disegno e la motivazione dello studio (Becker et al. 2024). Ogni partecipante ha ricevuto le stesse tre condizioni di intervento (musica scelta dal partecipante, musica scelta dal ricercatore e controllo) in ordine randomizzato (disegno a quadrato Latino). L'ascolto di un podcast informativo è servito come condizione di controllo. Ogni intervento sonoro è durato 20 minuti, dopo i quali è stata testata la resistenza al dolore mentre i partecipanti continuavano ad ascoltare.

Tra un intervento, è stato effettuato un periodo di wash-out di 20 minuti. Al termine di ciascun intervento, è stata testata la resistenza al dolore tramite stimoli elettrici crescenti come risultato primario dello studio. Inoltre come risultati secondari sono stati misurati la soglia al dolore, i punteggi del dolore percepito (Intensità e sgradevolezza) e la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e sono stati somministrati questionari psicologici per valutare emozione ed ansia. Inoltre è stato completato un sondaggio globale sul contesto socio-culturale. A causa della natura dello studio e degli interventi, né i partecipanti né i ricercatori erano in cieco.

La Figura 1 fornisce una panoramica completa del disegno dello studio.

2.2 | Popolazione dello studio

La dimensione del campione del campione con $n=84$ è stata calcolata sulla base di una precedente meta-analisi, ma tenendo conto di una dimensione dell'effetto leggermente inferiore (d di Cohen = 0.4) poiché è stato utilizzato un podcast come condizione di controllo non musicale (Kuhlmann et al. 2018). Lo studio ha utilizzato un reclutamento ed una randomizzazione stratificati in base al livello di istruzione, per garantire un campione diversificato in termini di contesto socio-culturale, poiché l'istruzione è un indicatore del capitale culturale (Coulangeon 2020). La randomizzazione e la

stratificazione sono state effettuate utilizzando Castor EDC (Ciwit BV., Amsterdam). Il campione includeva tre gruppi uguali di soggetti femminili con basso, medio ed alto livello di istruzione. Questi gruppi sono stati definiti secondo l'International Standard Classificazione dell'Educazione (Unesco Institute for Statistics 2012).

L'eterogeneità nella resistenza al dolore è in larga parte spiegata dal sesso. Ad esempio studi hanno dimostrato che le donne sono più sensibili agli stimoli elettrici e che la loro soglia al dolore è maggiormente influenzata dalla musica (Fillingim et al. 2009). Pertanto sono stati inclusi soltanto soggetti femminili in questo studio e sono stati trattati esclusivamente da ricercatrici, per prevenire differenze legate al sesso/genere nella misurazione del dolore. Inoltre sono stati inclusi solo adulti fino all'età di 60 anni, poiché negli anziani si osserva una ridotta reattività dell'attività autonoma che potenzialmente potrebbe influenzare le misurazioni dell'HRV. Pertanto questo studio ha incluso soggetti femminili sani di età compresa tra 18 e 60 anni. Una panoramica completa dei criteri di inclusione ed esclusione può essere consultata nella Tabella S1.

I partecipanti hanno fornito un consenso informato scritto e ricevuto un compenso finanziario per il tempo investito.

2.3 | Interventi

Questo studio ha utilizzato tre tipi di interventi sonori: musica scelta dal partecipante, musica scelta dal ricercatore e controllo. La musica scelta dai partecipanti è stata selezionata in anticipo con l'istruzione di scegliere circa 10 brani con l'obiettivo di ridurre il dolore. La playlist scelta dai ricercatori è stata selezionata dal nostro gruppo di ricerca e consisteva in musica classica popolare (Tabella S2). La condizione di controllo era un podcast neutro, focalizzato su argomenti informativi su flora e fauna, selezionato per essere non musicale e privo di contenuto politico od emotivo. La musica è stata riprodotta tramite Spotify e cuffie con cancellazione del rumore (JBL Tune 770 NC). La playlist scelta dai ricercatori è stata sempre riprodotta nello stesso ordine, mentre la musica scelta dal partecipante è stata riprodotta in modalità casuale.




FIGURE 1 | Study design. The figure illustrates the Latin-square crossover design of the study. After recruitment and randomisation, participants completed comprehensive baseline questionnaires (including questions about (parental) cultural capital, medical history and everyday music listening behaviour). Additionally, the sensation threshold was measured. Subsequently, each participant listened to the three interventions (self-chosen music, researcher-chosen music and control) in a randomised order (sequence 1, 2 or 3) for 20 min with headphones. At the end of each intervention, pain threshold (mA) and pain endurance (mA) were measured. Between the interventions, a 20-min washout period took place, in which pain intensity (NRS), pain unpleasantness (NRS), STAI-6 and SAM questionnaires were conducted. HRV was measured continuously during the three interventions. At the end of the experiment, personal experience of listening to music and the podcast was evaluated with open-ended questions. HRV, heart rate variability; mA, miliampere; NRS, numeric rating scale; SAM, Self-Assessment Manikin; STAI, Spielberger State-Trait Anxiety Inventory.

2.4 | Misurazioni

2.4.1 | Misurazioni del dolore

Il risultato primario di questo studio era la resistenza al dolore, quantificata in (mA), tramite stimoli elettrici crescenti somministrati al termine di ciascun intervento sonoro (musica scelta dal partecipante, musica scelta dal ricercatore e controllo). Gli stimoli elettrici sono stati somministrati tramite il dispositivo STMISOLA (Biopac Systems Inc., Goleta, CA, USA). Due elettrodi sono stati applicati al dito indice della mano non dominante. La somministrazione degli impulsi elettrici di 0,2 ms ad una frequenza di 100Hz iniziava quando i partecipanti premevano un pulsante con la mano dominante. Gli impulsi elettrici partivano da un'intensità di 0. mA, aumentando ad un ritmo di 0,5 mA/s, fino ad un massimo di 30 mA per motivi di sicurezza. Prima dell'esperimento è stata testata la soglia di percezione. Al termine di ciascun intervento, mentre i partecipanti ascoltavano l'intervento sonoro, veniva testata la resistenza al dolore, istruendo i partecipanti a tenere premuto il pulsante finché non riuscivano a sopportare più a

lungo il dolore.

Come risultati secondari, la soglia del dolore (misurata in mA) e i punteggi del dolore percepito (intensità e spiacevolezza) sono stati valutati al termine di ciascun intervento. La soglia del dolore è stata definita come il momento in cui i partecipanti indicavano che lo stimolo era diventato doloroso (mentre la resistenza al dolore era il momento in cui smettevano di tenere premuto il pulsante). Ogni stimolo è stato ripetuto tre volte e ne è stata calcolata la media. Dopo ciascun stimolo i partecipanti valutavano l'intensità e la spiacevolezza del dolore utilizzando una scala numerica (NRS) ad 11 punti.

2.4.2 | Valutazione fisiologica e psicologica

State-Trait Anxiety Inventory (STAI-6), le emozioni misurate tramite il Self-Assessment Manikin (SAM) ed un questionario sull'ascolto musicale al termine di tutti gli interventi. In primo luogo durante ciascun musicale e durante la procedura degli stimoli dolorosi la HRV è stata monitorata continuamente. La HRV che misura la variazione del tempo tra battiti cardiaci consecutivi, è un indicatore della funzione autonoma.

mica. La HRV è stata registrata utilizzando una fascia toracica Acentas (BM innovations GmbH) che fornisce una valutazione oggettiva delle risposte fisiologiche agli interventi.

Sono stati valutati anche i cambiamenti emotivi, dato il loro ruolo nella percezione del dolore. I livelli di ansia sono stati misurati con lo STAI-6 al punto basale e dopo ogni intervento. Le emozioni sono state ulteriormente valutate tramite il SAM negli stessi momenti temporali, valutando la valenza emotiva e l'eccitazione. Inoltre le esperienze dei partecipanti con la musica ed il podcast sono state valutate mediante cinque domande aperte al termine dell'esperimento. Le risposte aperte per il podcast sono state codificate come "gradito" o "non gradito".

2.4.3 | Contesto socio-culturale e caratteristiche musicali

Prima dell'esperimento, sono state valutate le caratteristiche demografiche dei partecipanti (es storia medica e la preferenza manuale) ed i contesti socio-culturali mediante questionari validati. Questi questionari sociologici si sono concentrati sul capitale culturale personale e genitoriale (Van der Waal. Et al. 2024). In particolare i partecipanti hanno completato un questionario per valutare il loro livello di istruzione, occupazione, reddito, etnia e sia il proprio livello culturale che quello dei genitori. Lo status socio-economico genitoriale è stato valutato in quanto rappresenta una chiave determinante della socializzazione precoce. È stato inoltre valutato il comportamento dell'ascolto musicale, compreso il numero di ore settimanali di ascolto passivo ed attivo, l'importanza della musica e se i partecipanti suonassero degli strumenti o fossero musicisti professionisti. Tutte le domande si basano sulla letteratura recente e sono descritte in dettaglio nel protocollo dello studio (Becker et al. 2024; Van der Waal et al. 2024).

La musica scelta dai partecipanti e quella scelta dai ricercatori è stata analizzata tramite l'API di Spotify. Le definizioni delle caratteristiche audio sono presentate nella Tabella S3. I sottogeneri forniti sono stati ridotti a 15 generi (Blues, Country, Classica, Easy listening, Elettronica, Folk/Acustica, Hip-Hop, Jazz, Latino, Metal, New Age, Pop, Rock, R&B,

World/Tradizionale) tramite un algoritmo di riduzione dei generi descritto in letteratura. (Chosic, List of Musuc Genres; Scarrat et al 2023). Le statistiche descrittive sono state calcolate ponderando il numero di brani per partecipante.

2.5 | Analisi statistica

I dati sono stati validati tramite Castor EDC (Ciwit BV., Amsterdam) ed analizzati con R-Studio (versione 4.3.2.), utilizzando i seguenti pacchetti: dplyr, ltidr, ggplot2 e nime. I parametri HRV sono stati calcolati con Kubios HRV Scientific (version 4.1.2) (Tarvainen et al. 2014). Il dominio temporale includeva la media della frequenza cardiaca (HR), la radice quadrata della media dei quadrati delle differenze successive (RMSSD) e la deviazione standard degli interventi NN (SDNN). Per il dominio in frequenza, sono stati calcolati i rapporti a bassa frequenza (LF), alta frequenza (HF) e LF/HF. A causa della variabilità della frequenza cardiaca, RMSSD e SDNN sono stati corretti utilizzando il coefficiente di variazione (cvRMSSD e cvSDNN), tenendo conto dell'intervallo RR medio del periodo corrispondente (de Geus et al. 2019). Una descrizione dei parametri HRV è presentata nella Tabella S4.

La distribuzione di tutte le variabili sono state valutate tramite visualizzazione dei dati (istogrammi e grafici Q-Q) e test di Shapiro-Wilk. Per le variabili numeriche normalmente distribuite, sono stati utilizzati media e deviazione standard (SD). Le percentuali sono state utilizzate per le variabili categoriali. Il risultato primario di questo studio, la resistenza al dolore, è stato analizzato utilizzando un modello lineare misto (LMM), considerando la sequenza ed il tipo di intervento. Questo metodo ha tenuto conto del disegno crossover dello studio. Le pendenze casuali sono state incluse in base ai criteri informativi ed ai test di verosimiglianza. Allo stesso modo, i risultati secondari (soglia del dolore, intensità del dolore, spiacevolezza del dolore (SAM, STAI-6 e HRV) sono stati analizzati utilizzando modelli LMM. Confronti a posteriori tra coppie sono stati effettuati per le misurazioni del dolore e quelle psicologiche utilizzando le medie marginali stimate derivate dagli effetti fissi dei LMM.

È stato adottato un approccio esplorativo per indaga-

re l'influenza del background socio-culturale sulla MIA attraverso i diversi interventi. I parametri dei contesti socio-culturali si basavano sulla letteratura consolidata ed includevano il capitale personale, il capitale culturale genitoriale ed il livello di istruzione (Jaeger e Breen 2016; Van der Waal et al. 2024). Il capitale culturale personale è stato misurato tramite la somma dei seguenti tre item: "partecipazione ad un concerto di musica classica, opera o balletto", visita ad un museo d'arte (visiva) e partecipazione ad uno spettacolo teatrale (esclusi i musical), basandosi su un ampio studio psicologico recente che ha utilizzato e validato questi tre item per misurare il capitale culturale (Vander Waal et al. 2024). I partecipanti hanno valutato la frequenza di queste attività su una scala di Likert a 7 punti da "mai" a "più di una volta a settimana".

Il capitale culturale genitoriale è stato misurato allo stesso modo, valutando con quale frequenza i genitori o tutori svolgevano tali attività durante l'infanzia del partecipante, in particolare tra i 12 ed i 14 anni. Il livello di istruzione è stato basato sul sistema educativo olandese (UNESCO) Institute for Statistics

2012). I parametri del contesto socio-culturale sono stati successivamente inclusi come termini di interazioni aggiuntive nei modelli LMM per valutarne l'influenza sulla resistenza al dolore e sulle altre misurazioni del dolore nei diversi gruppi di intervento. Infine, regressioni lineari semplici sono state utilizzate per modellare gli effetti del capitale culturale e del livello di istruzione sulla resistenza al dolore.

3 | Risultati

In totale, sono state incluse in questo studio 84 partecipanti di sesso femminile (Figura 2). Le caratteristiche basali della popolazione dello studio sono riportate nella Tabella 1. L'età media era di 38 anni (DS = 13,5, intervallo 18-60). In linea con i criteri di stratificazione, le partecipanti erano eterogenee per livello di istruzione. Circa la metà dei partecipanti era occupata e quasi un terzo (32%) aveva un contesto migratorio. Le partecipanti hanno riportato redditi personali mensili complessivamente bassi o nella media, prevalentemente nelle categorie "1500 Euro o meno" "36%" e da "1501 a 2500 Euro" "27%",




FIGURE 2 | CONSORT flow diagram. The three sequences represent the order in which participants listened to the three interventions.

TABLE 1 | Baseline characteristics of the study population.

Category	Value (n = 84)
Age (years) <i>mean</i> (SD)	38.2 (13.5)
Level of education ^a n (%)	
Primary and junior vocational education	5 (6)
Junior general secondary education	23 (27)
Senior general secondary and intermediate vocational education	24 (29)
Preuniversity education	4 (5)
Vocational colleges	9 (11)
University	19 (23)
Current occupation n (%)	
Student	16 (19)
Self-employed	9 (11)
Employed	46 (55)
Job seeking	3 (4)
(Partially) disabled	6 (7)
Other (voluntary work, takes care of household)	4 (5)
Income n (%)	
No income	4 (5)
EUR 1500 or less	30 (36)
EUR 1501 to 2500	23 (27)
EUR 2501 to 3500	21 (25)
EUR 3501 or more	4 (5)
Unknown	2 (2)
Income parents between 12 and 14 years n (%)	
Much lower than average	2 (2)
(Slightly) lower than average	20 (24)
Average	28 (33)
(Slightly) higher than average	25 (30)
Much higher than average	2 (2)
Unknown	7 (8)
BMI <i>mean</i> (SD)	26.6 (5.6)
Right handedness n (%)	70 (83)
Sensation threshold (mA) <i>mean</i> (SD)	2.1 (0.9)
Migration background ^b n (%)	
Yes	27 (32)
No	57 (68)
TRAIT anxiety (scale 20–80) <i>mean</i> (SD)	35.2 (9.6)

(Continues)

TABLE 1 | (Continued)

Category	Value (n = 84)
Appreciation for music (7-point Likert scale) <i>mean</i> (SD)	6.2 (1.1)
Appreciation for culture (7-point Likert scale) <i>mean</i> (SD)	5.0 (1.5)
Playing of an instrument n (%)	
Yes	27 (32)
No	57 (68)

Abbreviations: mA, milliampere; SD, standard deviation; TRAIT, Trait Anxiety Inventory.

^aLevel of education (currently pursuing or successfully completed) is based on the International Standard Classification of Education (UNESCO Institute for Statistics 2012). The Dutch synonyms are described more specifically in the protocol paper of this study.^bParticipant and/or at least one parent not born in the Netherlands.

che sono considerati bassi o medi per i Paesi Bassi. Il reddito dei genitori tra i 12 ed i 14 anni era distribuito in modo relativamente uniforme, con la maggior parte dei partecipanti che indicava un reddito genitoriale medio 33%). In generale, le partecipanti hanno espresso un 'elevata importanza attribuita alla musica (6,2 su una scala Likert a 7 punti).

3.1 | MIA nel contesto della scelta della musica

I risultati della misurazione del dolore sono stati analizzati utilizzando modelli lineari misti (LMM), tenendo conto della sequenza degli interventi consecutivi nel disegno crossover (Tabella 2). L'esito primario, la tolleranza al dolore, ha mostrato valori significativamente più alti per la musica scelta autonomamente rispetto alla condizione di controllo ($\beta = 0,74$ mA, IC 95% [0,26, 1,22], $p = 0,0033$), mentre la musica scelta dal ricercatore non ha mostrato differenze significative ($\beta = 0,27$ mA, IC 95% [-0,21, 0,75], $p = 0,2749$). La tolleranza al dolore e la soglia del dolore per i tre interventi sono visualizzate nella Figura 3.

Per quanto riguarda gli esiti secondari del dolore, la soglia del dolore era significativamente più alta sia per la musica scelta dal ricercatore ($\beta = 0,37$ mA, IC 95% [0,07, 0,68], $p = 0,0034$) rispetto alla condizione di controllo ($\beta = 0,43$, IC 95% [-0,67, -

TABLE 2 | Results of linear mixed models for pain measurements.

Outcome	Value	Intervention			Sequence eff
		Control	Researcher-chosen music	Self-chosen music	
Pain endurance (mA)	β (95% CI)	(ref.)	0.27 (−0.21; 0.75)	0.74 (0.26; 1.22)	0.25 (0.01; 0.4
	<i>p</i> -value	(ref.)	0.274	0.003**	0.044*
Pain threshold (mA)	β (95% CI)	(ref.)	0.37 (0.07; 0.68)	0.32 (0.03; 0.62)	0.22 (0.06; 0.3
	<i>p</i> -value	(ref.)	0.018*	0.034*	0.007**
Pain intensity (NRS)	β (95% CI)	(ref.)	−0.03 (−0.26; 0.20)	−0.43 (−0.67; −0.20)	0.16 (0.04; 0.2
	<i>p</i> -value	(ref.)	0.803	<0.001***	0.008**
Pain unpleasantness (NRS)	β (95% CI)	(ref.)	−0.08 (−0.35; 0.20)	−0.38 (−0.66; −0.11)	0.10 (−0.04; 0.
	<i>p</i> -value	(ref.)	0.595	0.007**	0.143

Note: Linear mixed models were conducted for the listed pain measurements under consideration of the intervention group (control, researcher-chosen music, self-chosen music) and the sequence of the interventions as part of the crossover design (sequence effect). The control intervention was set as the reference category. For pain threshold 80 unique participants were included, whereas for all other outcomes all 84 participants were included.

Abbreviations: CI, confidence interval; mA, milliamperes; NRS, numeric rating scale.

* $p < 0.05$.

** $p < 0.01$.

*** $p < 0.001$.




FIGURE 3 | Pain endurance and pain threshold across interventions. The figures illustrate violin plots for pain endurance (A) and pain threshold (B). Per intervention group (control, researcher-chosen music and self-chosen music), the individual data points for each participant are connected by thin lines and the mean ($\pm$ SD) values are displayed in bold lines. *p*-values are based on linear mixed models, as summarised in Table 2, with control set as the reference category. mA, milliamperes, SD, standard deviation. * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$.

0,20], $p < 0,001$), il che non si è verificato con la musica scelta dal ricercatore ($\beta = -0,03$, IC 95% [−0,26,0,20], $p = 0,803$). Allo stesso modo, il fastidio legato al dolore era minore con la musica scelta autonomamente ($\beta = -0,38$, IC 95% [−0,66,−0,11], $p = 0,007$) rispetto alla condizione di controllo, mentre la musica scelta dal ricercatore ($\beta = -0,08$, IC 95%

[−0,35,0,20], $p = 0,595$) non ha prodotto questo effetto.

Complessivamente, la sequenza degli interventi ha influenzato in modo significativo le misure del dolore, con valori più alti di tolleranza/soglia e punteggi di intensità del dolore più bassi osservati nel corso delle misurazioni, indipendentemente dal tipo di

intervento. Successivamente, sono stati condotti test post hoc per confrontare gli effetti degli interventi tra loro. Questi confronti non hanno indicato differenze tra la musica scelta autonomamente e quella scelta del ricercatore in termini di tolleranza, soglia del dolore o fastidio. Tuttavia, l'intensità del dolore era più bassa per la musica scelta autonomamente rispetto sia alla musica scelta dal ricercatore ($\beta = 0,40$, IC 95% [0,13,0,68], $p = 0,002$) sia al controllo ($\beta = 0,43$, IC 95% [0,16,0,71], $p < 0,001$) nel test post hoc.

3.2 | MIA nel contesto socio-culturale

È stato adottato un approccio esplorativo per indagare l'influenza di tre parametri di contesto socio-culturale (capitale culturale personale, capitale culturale genitoriale e livello di istruzione) sull'effetto MIA nei diversi interventi. Le distribuzioni di questi parametri sono mostrate nella Figura S1. L'aggiunta di questi parametri come termini di interazione (singolarmente ed insieme) ai modelli LMM (paragrafo 3.1) non ha influenzato significativamente l'effetto dell'intervento sulla tolleranza o sulle altre misurazioni del dolore. Tuttavia, questo approccio statistico potrebbe essere limitato dal numero di termini e di soggetti con il rischio di un eccessivo adattamento. Pertanto, sono state utilizzate semplici regressioni lineari per esplorare l'influenza dei parametri socio-culturali sulla tolleranza al dolore nei tre interventi (Figura 4).

Le distribuzioni del capitale culturale e del livello di istruzione erano bilanciate tra i gruppi di randomizzazione (sequenza degli interventi sonori), senza differenze statisticamente significativa tra i gruppi. Complessivamente, un maggiore capitale culturale ed un più alto livello di istruzione mostravano una tendenza (non significativa) verso un aumento della tolleranza al dolore, indipendentemente dal tipo di intervento.

La pendenza più ripida è stata osservata per la musica scelta dal ricercatore /0,75 mA, $p = 0,080$) in relazione al livello di istruzione rispetto alla musica scelta autonomamente (0,70mA; $p = 0,099$) ed al controllo (0,68mA, $p = 0,094$), con tendenze simili per il capitale culturale personale e genitoriale. In sintesi,

nessuna delle differenze tra i due gruppi di intervento ed i parametri socio-culturali è risultata statisticamente significativa. Ciò suggerisce che l'effetto positivo della musica scelta autonomamente sulla tolleranza al dolore era presente indipendentemente dal capitale culturale personale o genitoriale e dal livello di istruzione.

3.3 | Esiti fisiologici e psicologici

I risultati fisiologici e psicologici sono stati analizzati utilizzando LMM, in linea con le analisi delle misurazioni del dolore. I parametri HRV sono visualizzati ad intervalli di 5 minuti per i tre interventi come nella Figura 5. Analizzando questi parametri fisiologici, la frequenza cardiaca media, minima e massima era significativamente più alta per la musica scelta autonomamente rispetto alla condizione di controllo (Tabella S6). In particolare il cvRMSSD mostrava valori più alti nella musica scelta dal ricercatore ($\beta = 0,2$, IC 95% [0,0,0,3], $p = 0,009$) rispetto al controllo, mentre il cvSDNN non mostrava differenze significative né per la musica scelta autonomamente né per quella scelta dal ricercatore.

Osservando il settore della frequenza, la componente LF diminuiva con la musica scelta autonomamente ($\beta = 60,6$, IC 95% [28,9, 92,2], $p < 0,001$), mentre la componente HF aumentava con la musica scelta dal ricercatore ($\beta = 178,5$, IC 95% [90,6, 266,4], $p < 0,001$) rispetto alla condizione di controllo. Il rapporto LH/HF non mostrava differenze significative. Complessivamente l'ascolto della musica scelta autonomamente era associato ad una maggiore frequenza cardiaca ed a valori LF inferiori, mentre valori più alti di cvRMSSD ed HF indicavano una maggiore attività parasimpatica per la musica scelta dal ricercatore.

Per quanto riguarda i risultati psicologici (Tabella S7), la condizione di ansia era significativamente più bassa per la musica scelta autonomamente ($\beta = -2,5$, IC 95% [-3,8, -0,7], $p < 0,001$) e per quella scelta dal ricercatore ($\beta = -1,5$, IC 95% [-2,7, -0,7], $p = 0,028$) rispetto alla condizione di controllo. Questo effetto era maggiore per la musica scelta autonomamente, suggerendo che le partecipanti provavano meno ansia ascoltando musica selezionata da loro stesse.




FIGURE 4 | Influence of personal cultural capital, parental cultural capital and level of education on pain endurance per intervention. Influence of personal cultural capital (A), parental cultural capital (B) and level of education (C) on pain endurance for each intervention, modelled using simple linear regressions with 95% confidence intervals. Higher levels of education and cultural capital were associated with greater pain endurance. No statistically significant differences were found between intervention groups or socio-cultural background parameters. mA, milliamperere.




FIGURE 5 | Standardised heart rate variability parameters per intervention. The figures illustrate the mean and 95% confidence intervals for the standardised HR mean (A), cvSDNN (B), cvRMSSD (C), LF (D), HF (E) and LF/HF ratio (F) over time, per intervention. Each measurement point corresponds to a 5-min interval, with the pain stimulus occurring during the final interval. cv, coefficient of variation; HF, high frequency; HR, heart rate; LF, low frequency; RMSSD, root mean square of successive differences; SDNN, standard deviation of NN intervals.

Inoltre le partecipanti hanno valutato il proprio stato emotivo con il SAM (Figura S2). La musica scelta autonomamente ha portato ad una maggiore valenza rispetto alla condizione di controllo ($\beta = 0,7$, IC 95 [0,3, 1,0], $p < 0,001$). Anche la posizione dominante ha mostrato valori più alti per la musica scelta autonomamente rispetto al gruppo di controllo ($\beta = 0,4$, IC 95% [0,1,0,2], $p = 0,023$), indicando che le partecipanti si sentivano controllate. Non sono state trovate differenze significative tra gli interventi musicali ed il gruppo controllo per quanto riguarda l'eccitazione, sebbene una tendenza (non significativa) suggerisse che le partecipanti si sentissero più calme dopo aver ascoltato la musica scelta dal ricercatore ($\beta = 0,3$, IC 95% [-0,0,0,7], $p = 0,0081$). I confronti a coppie post hoc per le misure psicologiche (Tabella S8) non hanno rivelato differenze tra la

musica scelta autonomamente e quella scelta dal ricercatore in termini di ansia, valenza, eccitazione o dominanza. Inoltre utilizzando semplici regressioni lineari per esplorare l'influenza dei parametri socio-culturali sugli esiti psicologici nei tre interventi, non sono stati trovati risultati significativi.

3.4 | Caratteristiche degli interventi

Innanzitutto, caratteristiche della musica scelta autonomamente e di quella scelta dal ricercatore sono state analizzate tramite l'API di Spotify (Tabella S9). La musica scelta autonomamente mostrava valori superiori soprattutto per energia tempo (bpm) e ballabilità, rispetto alla musica scelta dal ricercatore. I generi prevalentemente scelti dalle partecipanti erano pop (37%, rock (18%), rhythm-and-blues

(14%, musica classica (6%) ed Hip-hop (5%) I generi musicali variavano tra i gruppi di stratificazione: il gruppo con livello di istruzione più alto selezionava più frequentemente musica classica, mentre il gruppo con istruzione più bassa sceglieva più frequentemente pop (olandese).

In secondo luogo è stato valutato il podcast a voce neutra su flora e fauna. Complessivamente, il 50% ($n = 0\ 42$) delle partecipanti ha apprezzato il podcast, mentre il 49% ($n = 41$) non lo ha gradito. Questa valutazione non differiva in modo significativo tra i gruppi di randomizzazione e di stratificazione.

4 | Discussione

L'obiettivo di questo studio era indagare se l'effetto della musica (autoselezionata) sulla tolleranza al dolore fosse coerente in diversi contesti socio-culturali. I nostri risultati indicano che la musica scelta autonomamente è stata efficace nella MIA (maggiore tolleranza alle soglie del dolore, punteggi del dolore percepiti più bassi) indipendentemente dal contesto socio-culturale (capitale culturale, livello di istruzione) e dal tipo di musica. La musica scelta autonomamente ha anche portato ad un aumento dell'attività simpatica (frequenza cardiaca più alta), una riduzione dell'ansia e ad una maggiore valenza. La musica scelta dai ricercatori (musica classica) è risultata più efficace nell'aumentare l'attività parasimpatica (RMSSD e HF più elevati). I confronti a coppie hanno rivelato che la musica scelta autonomamente ha portato ad una minore intensità del dolore rispetto alla musica "universale" scelta dai ricercatori, senza differenze significative osservate per nessun'altra misura del dolore.

4.1 | Effetto della musica sul dolore

Il nostro studio ha dimostrato che la tolleranza al dolore era maggiore con la musica scelta autonomamente, e che questo non era influenzato dal contesto socio-culturale. Questo risultato era in linea con le altre misure del dolore (soglia del dolore più alta, intensità del dolore più bassa e minore spiacevolezza del dolore). Ciò conferma la nostra prima ipotesi, suggerendo che l'effetto benefico della musica sul dolore scelta autonomamente rimane costante indi-

pendentemente dal contesto socio-culturale (livello di istruzione e capitale culturale) nella formazione del gusto musicale e nella percezione della musica (Bourdieu 1984; Hanser et al. 2016; Jaeger e Møllegaard 2022; Lizardo e Skiles 2016; Sonnett 2020; Van Eijck 2001). Tuttavia, fino ad ora, sebbene fosse ben stabilito che persone con contesti differenti abbiano gusti musicali diversi, non era chiaro se (i gusti per) diversi tipi di musica influenzassero in modo diverso la percezione del dolore. Inoltre, le ricerche precedenti sulla MIA non includevano popolazioni con contesti diversi rappresentative dei pazienti nei contesti sanitari (Lee 2016; Martin-Saavedra et al. 2018). Nel nostro studio partecipanti con contesti diversi hanno effettivamente selezionato tipi di musica molto differenti in termini di generi e caratteristiche. Ciononostante, l'effetto sul dolore della musica scelta autonomamente è stato costante, indicando che i benefici osservati della musica preferita sulla MIA erano guidati dalla preferenza personale e/o dalla scelta libera, piuttosto che dal tipo specifico di musica. Questo risultato supporta ed estende ricerche precedenti che indicano che il controllo percepito e le preferenze personali, indipendentemente dal genere musicale, sono fattori importanti nella MIA (Howlin e Rooney 2021^o; Van der Valk Bouman et al. 2024). È interessante notare che i test post hoc hanno rivelato una differenza significativa tra la musica scelta autonomamente, e quella scelta dai ricercatori solo per l'intensità del dolore. Rimane discutibile fino a che punto questa osservazione possa essere stata influenzata da fattori come la durata dell'ascolto, il tipo di musica scelta dai ricercatori e la natura dello stimolo doloroso. Ad esempio, una meta-analisi sul dolore cronico ha riportato effetti analgesici maggiori. Della musica scelta autonomamente, cosa che non è stata riscontrata con la musica scelta autonomamente, cosa che è stata riscontrata con la musica scelta dai ricercatori (Garza-Villarreal et al 2017). Tuttavia, i confronti diretti rimangono limitati nella letteratura, rendendo difficile trarre conclusioni definitive (Colebaugh et al. 2023; Valevicius et al. 2023).

In base alla nostra analisi, non ci sono prove sufficienti per supportare o rifiutare la seconda ipotesi, ovvero che la musica scelta dai ricercatori (classica) abbia un effetto analgesico universale. Ulteriori

ricerche che utilizzano approcci statistici alternativi (ad esempio interferenze Bayesiane) sono necessarie per valutare più a fondo questa ipotesi. Esaminando l'interazione tra la MIA ed il contesto socio-culturale, è stato interessante notare che un maggiore capitale culturale e livello di istruzione mostravano una tendenza (non statisticamente significativa) verso una maggiore tolleranza al dolore, con la pendenza più alta osservata per la musica scelta dai ricercatori (classica). Si potrebbe sostenere che ciò sia in linea con il concetto sociologico di cultura "intellettuale", secondo cui individui con maggiore capitale culturale e livello di istruzione sono più inclini ad apprezzare la musica classica (Lizardo e Skiles 2016). Con cautela, a causa della mancanza di significatività statistica, la tendenza verso una maggiore tolleranza al dolore tra individui con alto capitale culturale e istruzione può essere spiegata da studi precedenti che suggeriscono che gli individui altamente istruiti possiedono meccanismi di copia più efficaci (Holahan e Moos 1987). Tuttavia, la mancanza di significatività statistica in questo studio limita l'interpretazione del capitale culturale in relazione alla tolleranza al dolore, il che giustifica ulteriori ricerche.

4.2 | Meccanismi alla base della MIA

È interessante notare che sia la musica scelta autonomamente sia quella scelta dai ricercatori hanno portato a una soglia del dolore più elevata rispetto alla condizione di controllo (podcast).

Questo suggerisce che la musica in sé indipendentemente dalle sue caratteristiche, dal genere e dal controllo percepito come doloroso. In linea con ricerche precedenti, i partecipanti hanno riportato una maggiore valenza e un'ansia inferiore con la musica scelta autonomamente (Hofbauer e Rodriguez 2023; Roy et al. 2008), il che potrebbe aver contribuito all'efficacia della musica scelta dai ricercatori non ha mostrato differenze significative nella valenza rispetto sia alla condizione di controllo che alla musica scelta autonomamente. Ciò può spiegare in parte perché la musica selezionata dai ricercatori non ha avuto effetto sulla tolleranza al dolore rispetto ad entrambe le condizioni.

Altri meccanismi alla base della MIA potrebbero

anche spiegare i risultati di questo studio (Akelma et al. 2024; Basinski et al. 2021; Lunde et al. 2019). La distrazione è uno dei meccanismi frequentemente discussi in letteratura, e la misura in cui qualcosa è distraente potrebbe essere spiegata anche da fattori come la familiarità e la prevedibilità (Ancan e Soyman 2025; Howlin e Rooney 2020; Schafer e Sedimeier 2010). Poiché la musica scelta autonomamente è stata riprodotta in modalità casuale (shuffle), questo potrebbe aver rappresentato la combinazione ottimale tra previsione e sorprese per raggiungere la massima efficacia (Daikoku et al. 2024; Gold et al. 2023; Ueno e Shimada 2024). Dato che la condizione di controllo prevedeva l'ascolto di un podcast, è improbabile che la sola distrazione acustica spieghi gli effetti osservati. Altri possibili meccanismi dell'efficacia della musica scelta autonomamente in questo studio includono il rilascio di neurotrasmettitori e fattori contestuali come le aspettative e un possibile effetto placebo (Cheung et al. 2024; Valevicius et al. 2023; Vuust et al. 2022).

4.3 | Altri scopi e tipi di musica

In termini di variabilità della frequenza cardiaca (HRV), un'attività parasimpatica maggiore (RMSSD) è stata riscontrata con la musica scelta dai ricercatori, mentre un'attività simpatica maggiore (frequenza cardiaca media, minima e massima più elevate) è stata osservata con la musica scelta autonomamente rispetto alla condizione di controllo. In linea con questo, i partecipanti tendevano a valutare il loro livello di attivazione come più basso) statisticamente non significativo) con la musica scelta dai ricercatori. Questo stato più "rilassato" con la musica scelta dai ricercatori, sia auto-riferito che misurato tramite HRV potrebbe essere spiegato dalle caratteristiche della musica. Rispetto alla musica scelta dai ricercatori, quella scelta autonomamente aveva in generale maggiore energia, ballabilità e bpm, come già descritto in uno studio precedente (Howlin e Rooney 2021b). Inoltre, i partecipanti potrebbero aver percepito la musica scelta dai ricercatori come meno stimolante e coinvolgente, poiché non necessariamente in linea con le preferenze individuali. Tuttavia, in contesti clinici, in situazioni in cui è utile per i pazienti raggiungere una maggiore attività

parasimpatica, come prima di un intervento chirurgico, la musica scelta dai ricercatori (musica classica rilassante) potrebbe essere un'opzione ancora più efficace rispetto alla musica scelta autonomamente.

4.4 | Rilevanza clinica

I risultati di questo studio hanno diverse implicazioni. Primo, i nostri risultati suggeriscono che i pazienti dovrebbero essere ingaggiati a scegliere autonomamente la musica per la gestione del dolore, poiché la musica scelta autonomamente si è dimostrata efficace nella MIA attraverso diversi contesti socio-culturali. Secondo, l'osservazione che un capitale culturale ed un livello di istruzione più bassi hanno mostrato una tendenza (statisticamente non significativa) verso una minore tolleranza al dolore suggerisce con cautela che gli operatori sanitari dovrebbero prestare attenzione alla gestione del dolore nei pazienti con queste caratteristiche (Thurston et al. 2023). Terzo, il tipo di musica, in termini di caratteristiche, genere e da chi viene selezionata, potrebbe servire a scopi diversi. Mentre la musica scelta autonomamente è risultata più efficace per il dolore (acuto), la musica scelta dai ricercatori (classica) ha predetto una maggiore attività parasimpatica. Pertanto essere consapevoli della funzione desiderata dell'intervento musicale è cruciale per pazienti ed operatori sanitari. Nel complesso, questi risultati dimostrano che la selezione personalizzata della musica dovrebbe essere incoraggiata nella cura clinica, con i pazienti incoraggiati a scegliere la musica che meglio si adatta alle loro esigenze.

4.5 | Punti di forza, limitazioni e direzioni per ricerche future

Un punto di forza principale di questo studio è stata la popolazione eterogenea in termini di contesto socio-culturali. Questo è cruciale, poiché le ricerche sperimentali precedenti sulla MIA sono state tipicamente sovra-rappresentate da coorti di studio occidentali con un alto livello di istruzione (Becker et al. 2024; Leo 2016; Yi et al. 2025). Tuttavia, reclutare un numero sufficiente di partecipanti, specialmente da gruppi con un basso livello di istruzione, è stata un'importante sfida. Di conseguenza, il processo di

reclutamento di questo studio è stato completo e dispendioso in termini di tempo, poiché i partecipanti erano generalmente poco interessati a prendere parte a ricerche scientifiche. Questo riflette lo sforzo necessario per garantire un campione veramente diversificato che sia (più) rappresentativo della popolazione di pazienti.

Inoltre, questo studio è il primo ad integrare teorie e metodi sociologici nella ricerca medica sulla MIA, offrendo una prospettiva unica su questo tema. L'uso di un podcast come condizione di controllo ci ha permesso di controllare la componente di distrazione e trarre conclusioni più valide rispetto ad una condizione di controllo con il silenzio. Potrebbe essere interessante impiegare altre condizioni di controllo, come suoni naturali o media visivi (Choi e Park 2022). Un altro punto di forza è stato l'uso di un disegno crossover e dei modelli lineari misti (LMM), che hanno tenuto conto delle differenze individuali, dell'ordine sequenziale delle condizioni e hanno migliorato la robustezza dei nostri risultati. Considerando l'ordine delle condizioni come covariata nelle analisi, abbiamo scoperto che l'effetto della sequenza era significativo, evidenziando l'importanza di considerare tali effetti sia nella progettazione dello studio che dell'interpretazione.

Sono state inoltre incluse solo partecipanti di sesso femminile, il che ha reso le misurazioni del dolore meno influenzate da potenziali interazioni di genere, poiché anche tutte le ricercatrici coinvolte nello studio erano donne.

Tuttavia, ciò può anche essere visto come una limitazione, poiché i risultati di questo studio sono meno trasferibili agli uomini e alle persone che si identificano come non binarie, che dovrebbero essere indagate in ricerche future. Un'altra limitazione risiede nel fatto che questo studio è stato il primo ad esplorare la MIA nel contesto del contesto socio-culturale e non è stato specificamente progettato per rilevare differenze significative in questi parametri, sono necessari ulteriori studi con campioni di dimensioni maggiori per corroborare questi risultati. In questo contesto, la ricerca futura potrebbe anche esplorare il potenziale di interventi musicali personalizzati abilitati dall'IA in ambito sanitario, tenendo conto dei parametri socio-culturali.

Inoltre, questo studio, come molti altri sulla MIA, è

stato condotto con volontari sani. Pertanto, sono necessarie ulteriori ricerche in contesti clinici con pazienti per convalidare questi risultati. Poiché la percezione del dolore è un'esperienza multidimensionale ed altamente soggettiva, la sua misurazione presenta alcune sfide. In questo studio, abbiamo utilizzato la tolleranza al dolore come risultato primario più oggettivo, il che può introdurre bias, poiché i partecipanti possono interrompere volontariamente la sequenza di emozioni. Tuttavia, metodi comparabili affrontano spesso sfide simili in termini di bias o questioni etiche.

Un'altra considerazione è che la tolleranza al dolore è fortemente correlata ad altre misure come l'intensità del dolore ed il disagio. Sebbene queste misure del dolore siano generalmente risultate coerenti tra loro, non sono indipendenti, e questa sovrapposizione dovrebbe essere considerata nell'interpretazione dei nostri risultati.

Infine questo studio non ha trovato evidenze che la musica scelta autonomamente sia superiore a quella scelta dai ricercatori, contrariamente alle nostre aspettative. Rimane incerto se questo risultato sia dovuto al disegno dello studio o a caratteristiche specifiche della musica. Dato il complesso intreccio tra le caratteristiche musicali e le preferenze individuali, è difficile distinguere i rispettivi contributi. Sebbene i nostri risultati suggeriscano che la musica scelta autonomamente sia efficace, probabilmente grazie all'allineamento tra scelte personale e preferenza, anche le differenti caratteristiche musicali tra la musica scelta autonomamente e quella scelta dai ricercatori potrebbe aver influenzato il risultato. Studi futuri dovrebbero mirare a isolare più precisamente questi fattori.

5 | Conclusione

In conclusione, questo studio indica che la musica scelta autonomamente è efficace per la MIA (maggiore tolleranza e soglia del dolore, punteggi

percepiti di dolore inferiori), risultato che si è mantenuto costante indipendentemente dal contesto socio-culturale e dal tipo di musica. La musica scelta autonomamente ha anche determinato un aumento dell'attività simpatica (frequenza cardiaca più alta), una riduzione dell'ansia ed una maggiore valenza. La musica scelta dai ricercatori (classica) è risultata invece più efficace nell'aumentare l'attività parasimpatica (maggiore RMSSD e HF). Pertanto, questo studio evidenzia che la musica è efficace nella MIA quando si allinea alle preferenze personali, incoraggiando un approccio personalizzato nell'uso della musica per il sollievo dal dolore.

Traduzione a cura di Caterina Aurilio

Contributi degli autori

Questo studio è stato progettato da A.S.B., E.S.v.d.V.B., J.S., K.v.E., C.C.d.V. e M.K. Gli esperimenti sono stati eseguiti da A.S.B., E.S.v.d.V.B., Z.B. e C.S. I dati sono stati analizzati da E.S.v.d.V.B. e A.S.B. e i risultati sono stati esaminati criticamente da tutti gli autori. A.S.B. ed E.S.v.d.V.B. hanno avuto un ruolo primario nella preparazione del manoscritto, la cui revisione è stata affidata a J.S., K.v.E., Z.B., C.S., H.J., C.C.d.V. e M.K. Tutti gli autori hanno approvato la versione finale del manoscritto e si assumono la responsabilità di tutti gli aspetti del lavoro.

Ringraziamenti

Gli autori desiderano ringraziare i colleghi del Dipartimento di Medicina del Dolore, in particolare Dorine Siepmann, Frank Huygen e tutto il personale della segreteria, per il loro supporto logistico a questo studio. Ringraziamo inoltre Biocheck BV per la loro competenza e assistenza nelle misurazioni della variabilità della frequenza cardiaca. Ringraziamo inoltre Babette van Eekelen, Melissa Smienk, Merle van Groeningen, Roos Cats e Rowanne van Raaij per il loro aiuto nell'inclusione dei partecipanti allo studio. Ringraziamo inoltre Arianne van Bochove per conto di Albeda Rotterdam, Chander Beerthuis dell'Università delle Arti di Utrecht, Edith Simson per conto di Stichting Orenda, Floris Barendrecht per conto di HagoZorg e Hanne Boudesteijn per conto di Zadkine Rotterdam per il loro prezioso supporto nel reclutamento di partecipanti provenienti da diversi contesti socioculturali. Infine, vorremmo ringraziare Jelle Kouters per il suo aiuto nell'estrazione delle funzionalità audio.

Conflitti di interesse

Gli autori dichiarano di non avere conflitti di interesse.

Dichiarazione di disponibilità dei dati

Tutti i dati e i codici di programma sono disponibili su motivata richiesta all'autore corrispondente.

BIBLIOGRAFIA

- Akelma, F. K., S. Altunsoy, B. Nalbant, D. Özkan, and J. Ergil. 2024. "Comparison of Classical and Patient-Preferred Music on Anxiety and Recovery After Inguinal Hernia Repair: A Prospective Randomized Controlled Study." *Perioperative Medicine* 13, no. 1:89. <https://doi.org/10.1186/s13741-024-00434-3>.
- Arican, N. B., and E. Soyman. 2025. "A Between-Subjects Investigation of Whether Distraction Is the Main Mechanism Behind Music-Induced Analgesia." *Scientific Reports* 15, no. 1: 2053.
- Basinski, K., A. Zduń-Ryzewska, D. M. Greenberg, and M. Majkowicz. 2021. "Preferred Musical Attribute Dimensions Underlie Individual Differences in Music-Induced Analgesia." *Scientific Reports* 11, no. 1:8622. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-87943-z>.
- Becker, A. S., E. S. van der Valk Bouman, J. Schaap, et al. 2024. "A Multidisciplinary Approach on Music Induced-Analgesia Differentiated by Socio-Cultural Background in Healthy Volunteers (MOSART): A Cross-Over Randomized Controlled Trial Protocol." *Contemporary Clinical Trials Communications* 39: 101313. <https://doi.org/10.1016/j.cctc.2024.101313>.
- Bourdieu, P. 1984. *Distinction a Social Critique of the Judgement of Taste*. Routledge.
- Cheung, V. K. M., P. M. C. Harrison, S. Koelsch, M. T. Pearce, A. D. Friederici, and L. Meyer. 2024. "Cognitive and Sensory Expectations Independently Shape Musical Expectancy and Pleasure." *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences* 379, no. 1895: 20220420.
- Choi, S., and S. G. Park. 2022. "Effects of Anxiety-Related Psychological States on Music-Induced Analgesia in Cold Pressor Pain Responses." *Explore (New York, N.Y.)* 18, no. 1: 25–30.
- Chosic. List of Music Genres. <https://www.chosic.com/list-of-music-genres>.
- Colebaugh, C. A., J. M. Wilson, K. M. Flowers, et al. 2023. "The Impact of Varied Music Applications on Pain Perception and Situational Pain Catastrophizing." *Journal of Pain* 24, no. 7: 1181–1192.
- Coulangeon, P. 2020. "Cultural Capital." In *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, 1–3. Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeos.c169.pub2>.
- Cowen, A. S., X. Fang, D. Sauter, and D. Keltner. 2020. "What Music Makes Us Feel: At Least 13 Dimensions Organize Subjective Experiences Associated With Music Across Different Cultures." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117, no. 4: 1924–1934.
- Daikoku, T., M. Tanaka, and S. Yamawaki. 2024. "Bodily Maps of Uncertainty and Surprise in Musical Chord Progression and the Underlying Emotional Response." *Science* 27, no. 4: 109498.
- de Geus, E. J. C., P. J. Gianaros, R. C. Brindle, J. R. Jennings, and G. G. Berntson. 2019. "Should Heart Rate Variability Be 'Corrected' for Heart Rate? Biological, Quantitative, and Interpretive Considerations." *Psychophysiology* 56, no. 2: e13287.
- Fillingim, R. B. 2017. "Individual Differences in Pain: Understanding the Mosaic That Makes Pain Personal." *Pain* 158, no. Suppl 1: S11–S18. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000775>.
- Fillingim, R. B., C. D. King, M. C. Ribeiro, D. Dasilva, B. Rahim-Williams, and J. L. Riley III. 2009. "Sex, Gender, and Pain: A Review of Recent Clinical and Experimental Findings." *Journal of Pain* 10, no. 5: 447–485. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2008.12.001>.
- Fu, V. X., P. Oomens, M. Klimek, M. H. J. Verhofstad, and J. Jeekel. 2020. "The Effect of Perioperative Music on Medication Requirement and Hospital Length of Stay: A Meta-Analysis." *Annals of Surgery* 272, no. 6: 961–972.
- Garza-Villarreal, E. A., V. Pando, P. Vuust, and C. Parsons. 2017. "Music-Induced Analgesia in Chronic Pain Conditions: A Systematic Review and Meta-Analysis." *Pain Physician* 20, no. 7:597–610.
- Gold, B. P., M. T. Pearce, A. R. McIntosh, C. Chang, A. Dagher, and R. J. Zatorre. 2023. "Auditory and Reward Structures Reflect the Pleasure of Musical Expectancies During Naturalistic Listening." *Frontiers in Neuroscience* 17: 1209398. <https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1209398>.
- Hanser, W. E., T. F. M. ter Bogt, A. J. M. Van den Tol, R. E. Mark, and A. J. J. M. Vingerhoets. 2016. "Consolation Through Music: A Survey Study." *Musicae Scientiae* 20, no. 1: 122–137. <https://doi.org/10.1177/1029864915620264>.
- Hofbauer, L. M., and F. S. Rodriguez. 2023. "Emotional Valence Perception in Music and Subjective Arousal: Experimental Validation of Stimuli." *International Journal of Psychology* 58: 465–475.
- Holahan, C. J., and R. H. Moos. 1987. "Personal and Contextual Determinants of Coping Strategies." *Journal of Personality and Social Psychology* 52, no. 5: 946–955. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.5.946>.
- Hole, J., M. Hirsch, E. Ball, and C. Meads. 2015. "Music as an Aid for Postoperative Recovery in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis." *Lancet* 386, no. 10004: 1659–1671. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60169-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60169-6).
- Howlin, C., and B. Rooney. 2020. "The Cognitive Mechanisms in Music Listening Interventions for Pain: A Scoping Review." *Journal of Music Therapy* 57, no. 2: 127–167.
- Howlin, C., and B. Rooney. 2021a. "Cognitive Agency in Music Interventions: Increased Perceived Control of Music Predicts Increased Pain Tolerance." *European Journal of Pain* 25, no. 8: 1712–1722. <https://doi.org/10.1002/ejp.1780>.
- Howlin, C., and B. Rooney. 2021b. "Patients Choose Music With High Energy, Danceability, and Lyrics in Analgesic Music Listening Interventions." *Psychology of Music* 49, no. 4: 931–944. <https://doi.org/10.1177/0305735620907155>.
- Jaeger, M. M., and R. Breen. 2016. "A Dynamic Model of Cultural Reproduction." *American Journal of Sociology* 121, no. 4: 1079–1115. <https://doi.org/10.1086/684012>.
- Jäger, M., and S. Møllegaard. 2022. "Where Do Cultural Tastes Come From? Genes, Environments, or Experiences." *Sociological Science* 9: 252–274. <https://doi.org/10.15195/v9.a11>.
- Kakar, E., E. Venema, J. Jeekel, M. Klimek, and M. van der Jagt. 2021. "Music Intervention for Sleep Quality in Critically Ill and Surgical Patients: A Meta-Analysis." *BMJ Open* 11, no. 5: e042510.
- Koelsch, S., and L. Jäncke. 2015. "Music and the Heart." *European Heart Journal* 36, no. 44: 3043–3049. <https://doi.org/10.1093/eurh/ehv430>.
- Kühlmann, A. Y. R., A. de Rooij, L. F. Kroese, M. van Dijk, M. G. M. Hunink, and J. Jeekel. 2018. "Meta-Analysis Evaluating Music Interventions for Anxiety and Pain in Surgery." *British Journal of Surgery* 105, no. 7:773–783.
- Lee, J. H. 2016. "The Effects of Music on Pain: A Meta-Analysis." *Journal of Music Therapy* 53, no. 4: 430–477. <https://doi.org/10.1093/jmt/thw012>.
- Lizardo, O., and S. Skiles. 2016. "Cultural Objects as Prisms: Perceived Audience Composition of Musical Genres as a Resource for Symbolic Exclusion." *Socius* 2: 2378023116641695. <https://doi.org/10.1177/2378023116641695>.
- Lunde, S. J., P. Vuust, E. A. Garza-Villarreal, and L. Vase. 2019. "Music-Induced Analgesia: How Does Music Relieve Pain?" *Pain* 160, no. 5: 989–993. <https://doi.org/10.1097/j.pain.00000000000001452>.
- Martin-Saavedra, J. S., L. D. Vergara, I. Pradilla, A. Velez-van-Meerbeke, and C. Talero-Gutierrez. 2018. "Standardizing Music Characteristics for the Management of Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials." *Complementary Therapies in Medicine* 41: 81–89. <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2018.07.008>.
- Meints, S. M., A. Cortes, C. A. Morais, and R. R. Edwards. 2019. "Racial and Ethnic Differences in the Experience and Treatment of Noncancer Pain." *Pain Management* 9, no. 3: 317–334. <https://doi.org/10.2217/pmt-2018-0030>.
- Meints, S. M., M. M. Miller, and A. T. Hirsh. 2016. "Differences in Pain Coping Between Black and White Americans: A Meta-Analysis." *Journal of Pain* 17, no. 6: 642–653. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2015.12.017>.
- Roy, M., I. Peretz, and P. Rainville. 2008. "Emotional Valence Contributes to Music-Induced Analgesia." *Pain* 134, no. 1-2: 140–147.
- Scarratt, R. J., O. A. Heggli, P. Vuust, and K. V. Jespersen. 2023. "The Audio Features of Sleep Music: Universal and Subgroup Characteristics." *PLoS One* 18, no. 1: e0278813. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278813>.
- Schäfer, T., and P. Sedlmeier. 2010. "What Makes Us Like Music? Determinants of Music Preference." *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts* 4, no. 4: 223–234. <https://doi.org/10.1037/a0018374>.
- Song, Y., N. Ali, and U. M. Nater. 2024. "The Effect of Music on Stress Recovery." *Psychoneuroendocrinology* 168: 107137.
- Sonnert, J. 2020. "Musical Relationships: Intersections of Race, Gender, Genre, and Listening Situation." *Cultural Sociology* 15, no. 1: 44–68. <https://doi.org/10.1177/1749975520929240>.
- Tarvainen, M. P., J.-P. Niskanen, J. A. Lipponen, P. O. Rantaaho, and P. A. Karjalainen. 2014. "Kubios HRV – Heart Rate Variability Analysis Software." *Computer Methods and Programs in Biomedicine* 113, no. 1: 210–220. <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2013.07.024>.
- Ter Bogt, T. F. M., J. Mulder, Q. A. W. Raaijmakers, and S. N. Gabhainn. 2011. "Moved by Music: A Typology of Music Listeners." *Psychology of Music* 39, no. 2: 147–163. <https://doi.org/10.1177/0305735610370223>.
- Thurston, K. L., S. J. Zhang, B. A. Wilbanks, R. Billings, and E. N. Aroke. 2023. "A Systematic Review of Race, Sex, and Socioeconomic Status Differences in Postoperative Pain and Pain Management." *Journal of Perianesthesia Nursing* 38, no. 3: 504–515. <https://doi.org/10.1016/j.jopan.2022.09.004>.
- Ueno, F., and S. Shimada. 2024. "Neural Mechanism of Musical Pleasure Induced by Prediction Errors: An EEG Study." *Brain Sciences* 14, no. 11: 1130.
- Umbrello, M., T. Sorrenti, G. Mistràletti, P. Formenti, D. Chiumello, and S. Terzoni. 2019. "Music Therapy Reduces Stress and Anxiety in Critically Ill Patients: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials." *Minerva Anestesiologica* 85, no. 8: 886–898.
- UNESCO Institute for Statistics. 2012. *International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 (78-92-9189-123-8)*. <https://search.library.wisc.edu/catalog/999549122202121>.
- Valevicius, D., A. Lépine Lopez, A. Dushkevica, A. C. Lee, and M. Roy. 2023. "Emotional Responses to Favorite and Relaxing Music Predict Music-Induced Hypoalgesia." *Frontiers in Pain Research* 4: 1210572. <https://doi.org/10.3389/fpain.2023.1210572>.
- Van der Valk Bouman, E. S., A. S. Becker, J. Schaap, et al. 2024. "The Impact of Different Music Genres on Pain Tolerance: Emphasizing the Significance of Individual Music Genre Preferences." *Scientific Reports* 14, no. 1: 21798.
- Van der Waal, J., W. de Koster, T. van Meurs, K. Noordzij, J. O. Groeniger, and J. Schaap. 2024. "Advancing Stratification Research by Measuring Non-Declarative Cultural Capital: A National Population-Based Study Combining IAT and Survey Data." *American Sociological Review* 89, no. 4:735–760. <https://doi.org/10.1177/00031224241261603>.
- Van Eijck, K. 2001. "Social Differentiation in Musical Taste Patterns." *Social Forces* 79, no. 3: 1163–1185.
- Vuust, P., O. A. Heggli, K. J. Friston, and M. L. Kringsbach. 2022. "Music in the Brain." *Nature Reviews. Neuroscience* 23, no. 5: 287–305.
- Yi, W. A.-O., C. A.-O. Palmer, A. Serian, and M. Roy. 2025. "Individualizing Musical Tempo to Spontaneous Rates Maximizes Music-Induced Hypoalgesia." *Pain* 166, no. 8: 1761–1768. <https://doi.org/10.1097/j.pain.00000000000003513>.

Informazioni aggiuntive

Ulteriori informazioni di supporto sono disponibili online nella sezione Informazioni di supporto. Dati S1: Informazioni di supporto.

© 2025 The Author(s). European Journal of Pain published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of European Pain Federation - EFIC ®.

Come citare l'articolo:

Becker AS, van der Valk Bouman ES, Schaap J, van Eijck K, Bierman Z, Saat C, Jeekel H, de Vos CC, Klimek M. Self-Chosen Music as a Contributor to Music-Induced Analgesia Across Diverse Socio-Cultural Backgrounds: A Crossover Randomised Controlled Trial. *Eur J Pain*. 2025 Sep;29(8):e70095. doi: 10.1002/ejp.70095. PMID: 40772832; PMCID: PMC12330777.

25-27 settembre 2025, Centro Congressi Lingotto

Torino ha ospitato il 48° Congresso dell'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore

Un evento che mette al centro ricerca, innovazione e collaborazione multidisciplinare

Dal 25 al 27 settembre Torino gli esperti di terapia del dolore si sono riuniti per il 48° Congresso dell'AISD, Associazione Italiana per lo Studio del Dolore, presso il Centro Congressi Lingotto.

L'evento, che ha registrato oltre 600 iscritti, ha proposto un programma scientifico ricco e multidisciplinare, articolato in tre sale con sessioni parallele, workshop e simposi congiunti con altre società scientifiche.

Il congresso ha affrontato i grandi temi della medicina del dolore, problematica che, non dimentichiamolo, affligge un europeo su cinque, con un impatto socioeconomico notevole, oltre alla sofferenza psicologica che facilmente si innesca in situazioni croniche non adeguatamente curate.

Quali novità?

«Abbiamo inserito nel programma scientifico le tematiche classiche che non possono mancare in un congresso sul dolore, affiancandole però ad altre più innovative - spiega il presidente AISD prof. Diego Fornasari, Università di Milano "La Statale"-. Abbiamo parlato di dolore acuto post operatorio, dolore cronico, dolore neuropatico, osteoartrosi, dolore nociplastico, con focus su aspetti ancora poco esplorati come il dolore nel bambino, il dolore nell'animale e il dolore vascolare. In particolare mi fa piacere segnalare lo spazio che il programma scientifico ha riservato al dolore nel bambino, un tema ovviamente non nuovo ma raramente trattato in un contesto di specialisti algologi e in una visione multidisciplinare.»

Torino



La terapia del dolore è disciplina multidisciplinare per eccellenza

«La multidisciplinarietà, d'altronde, - continua il prof. Fornasari - è un punto di grande forza della nostra società scientifica, importante per una efficace presa in carico del paziente con dolore che riesca a migliorare la sua qualità di vita». «Alla reumatologia, che è disciplina dove il dolore è dominante - conferma il prof. Piercarlo Sarzi Puttini, noto reumatologo dell'Università di Milano e grande esperto di fibromialgia - sicuramente l'algologia può offrire altri punti di vista e terapie».

L'importanza della collaborazione interdisciplinare

L'AISD è nata come società scientifica multidisciplinare e incoraggia importanti collaborazioni interdisciplinari con società scientifiche diverse per sviluppare tematiche, ovviamente comuni, connesse alla medicina del dolore. Durante il Congresso le sessioni congiunte con altre società scientifiche si sono confermate come un momento di confronto molto interessante e utile: con la SIMFER, Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, dove si è discusso di esercizio fisico e dolore, cioè come l'esercizio ci aiuta nel trattamento del dolore e come l'esercizio può

essere causa di dolore, per esempio nell'atleta e nello sportivo. Una sessione con la SIRN, Società Italiana di Riabilitazione Neurologica ha trattato il tema delle lesioni meccaniche del nervo periferico. Con la SIMG, Società Italiana Medicina Generale, è stato programmato un seminario sul percorso che il paziente fragile anziano, o con patologie particolari e con dolore cronico, deve affrontare, quali specialisti incontra in prima battuta e come si può migliorare questo percorso, con la partecipazione non solo dei medici di famiglia ma anche di infermieri e fisioterapisti.



Nuovi farmaci, tecniche interventistiche, nutraceutici e medicina complementare

Ampio spazio è stato poi dedicato alle tecniche interventistiche, ai nutraceutici, alle medicine complementari. «Le tecniche interventistiche - commentano i proff. Enrico Polati e Vittorio Schweiger, Università di Verona - sono cruciali in vari casi più complessi e per questo servono specialisti adeguatamente formati, ma nel corso del Congresso si è parlato naturalmente anche di nuovi farmaci e di nutraceutici che stanno acquisendo un ruolo sempre più importante nella terapia del dolore, affiancando i farmaci.»

Il dolore oncologico ha avuto un suo importante spazio con la sessione sulle cure palliative e con una sessione curata dalla prof. Filomena Puntillo. Università di Bari, su tecniche poco sfruttate come la terapia intratecale, ma che devono essere prese in considerazione.

La cerimonia inaugurale ha visto come ospite d'onore il professor Fabrizio Benedetti, Università di Torino, tra i massimi esperti internazionali nello studio del placebo e del nocebo, con una lettura dal titolo: "Farmacologia e tossicologia delle parole: provocazione o realtà?".


«È la terza volta che il congresso AISD è stato ospitato a Torino, dopo le edizioni del 1987 del 2001 - sottolinea il dottor Nicola

Luxardo, Struttura Complessa di Terapia del Dolore, ASL Città di Torino e presidente del Comitato organizzatore locale del Congresso - Anche in questa edizione siamo riusciti a creare uno spazio e un tempo dedicato alla cultura del dolore e della sofferenza, come obiettivo etico e assistenziale fondamentale per assicurare la qualità delle cure erogate ai pazienti, e parallelamente al confronto interdisciplinare, per una migliore preparazione professionale, generata dallo scambio delle informazioni scientifiche.»



Torino

48°
CONGRESSO
NAZIONALE
AISD





IN ETÀ PEDIATRICA IL DOLORE CRONICO NON ONCOLOGICO ESISTE

Se ne è parlato a Torino durante il 48° Congresso dell'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore

Il dolore cronico pediatrico impatta negativamente sulla crescita dei bambini e degli adolescenti con importante riduzione della funzionalità fisica e sociale e conseguente discostamento dalle normali tappe di crescita che il soggetto in età evolutiva dovrebbe seguire.

Studi internazionali indicano una prevalenza media del 20% con una disabilità dolore correlata intorno al 5%.

Un contesto di specialisti di medicina del dolore per una tematica importante

«Il dolore pediatrico non è una tematica nuova ma raramente viene trattata in un contesto di specialisti algologi e in una visione interdisciplinare. Abbiamo affidato con piacere l'organizzazione delle due sessioni scientifiche al dottor Lorenzo Moscaritolo, anestesista algologo che lavora presso il Centro Interdisciplinare di diagnosi e cura del dolore complesso in età pediatrica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino - sottolinea il prof. Diego Fornasari, presidente dell'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore.»

Alle due sessioni hanno partecipato esperti algologi, pediatri, infermiere pediatriche e una psicologa.

«Il modo migliore per curare bambini e adolescenti affetti da dolore cronico è infatti un approccio trasversale integrato con più discipline e l'intervento tempestivo e corretto permette ai giovani pazienti di diventare capaci di conoscere il loro dolore, gestirlo e restare funzionali - conferma il dottor Lorenzo Moscaritolo, anestesista presso il Centro Interdisciplinare di diagnosi e cura del dolore complesso in età pediatrica, Ospedale Infantile Regina Margherita -. Spesso un intervento precoce e ben strutturato permette loro di diventare adulti senza dolore, perché di dolore cronico in età pediatrica si può guarire. L'esperienza di lavoro nel nostro Centro testimonia la possibilità di successo. Il Centro è il primo Centro italiano, riconosciuto dalla Chronic Pain World Pediatric List, a lavorare secondo le indicazioni suggerite da tempo dall'ICD-11 (International Classification of Diseases) e dalla IASP. Il gruppo interdisciplinare di lavoro è composto da un medico terapeuta del dolore, due infermiere pediatriche, una psicologa, una terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e un'assistente sociale. Collaborano con il servizio altri professionisti tra cui: neuropsichiatra infantile, fisiatra, fisioterapista.

L'approccio si compone di terapie farmacologiche e non farmacologiche (come agopuntura, mindfulness, ipnosi clinica, per citarne alcune), terapie interventistiche, terapia fisica riabilitativa psico-motoria, terapia psicologica mirata all'acquisizione di strategie di coping per il dolore, assistenza psicologica e terapia educativa per i genitori di pazienti affetti da dolore complesso.»

Tra i relatori, oltre a Lorenzo Moscaritolo hanno dato il loro contributo di conoscenza ed esperienza: Pablo Mauricio Ingelmo (Università Milano Bicocca, Responsabile Anestesia pediatrica dell'Ospedale San Gerardo di Monza), Franca Fagioli (Università degli Studi di Torino, Direttore Dipartimento Patologia e Cura del Bambino Ospedale Infantile Regina Margherita), Laura Papetti (pediatra, Ospedale Bambin Gesù, Roma). Sono inoltre intervenute Paola Bruna (infermiera pediatrica), Giorgia Fenocchio (psicologa) Giovanna Gliozzi (terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva) che lavorano presso il Centro del Regina Margherita, Milena Muro (infermiera esperta di ipnosi clinica, Città della Scienza e della Salute) e infine Nicola Luxardo (direttore UOC Terapia del Dolore Ospedale Oftalmico, Torino).







Torino

48°
CONGRESSO
NAZIONALE
AISD





Vincenzo Damico

PERSISTENT OPIOID USE AFTER INTENSIVE CARE ADMISSION: A 10-YEAR OBSERVATIONAL POPULATION-BASED COHORT STUDY IN A NORTHERN ITALIAN HOSPITAL



Alex Patton

IDENTIFICATION OF CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CORRELATIONS IN FIBROMYALGIA SYNDROME (FMS): OBSERVATIONAL STUDY ON 200 PATIENT



Francesco Paolo Fabrazzo

ROLE OF EXTRACORPOREAL MAGNETOTRANSDUCTION THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH LOW BACK PAIN



Federica Gloria

THE COMBINATION OF ZICONOTIDE TO INTRATHECAL BACLOFEN EFFECTIVELY AND SAFELY CONTROL NEUROPATHIC PAIN IN MULTIPLE SCLEROSIS: A CASE REPORT WITH A 4-YEAR FOLLOW UP



Vittorio Fabbriatore

LOCOREGIONAL ANESTHESIA FOR POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT IN BURN PATIENTS UNDERGOING ESCHARECTOMY AND AUTOLOGOUS SKIN GRAFT SURGERY

Mezzo secolo di medicina del dolore: dalla biologia molecolare all'intelligenza artificiale



Il Congresso organizzato dalla Fondazione Menarini e dalla Fondazione Paolo Procacci per ricordare il Primo Congresso IASP del 1975

A cinquant'anni dal primo congresso mondiale della International Association for the Study of Pain (IASP), Firenze ha ospitato dal 12 al 13 settembre il congresso "Pain Medicine, a long journey". Grazie all'organizzazione dalla Fondazione Menarini e dalla Fondazione Paolo Procacci i massimi esperti mondiali si sono incontrati per discutere i più recenti progressi nella comprensione e nel trattamento del dolore acuto e cronico.

Doveroso ricordare che dagli anni '50, nella Clinica Medica dell'Ospedale Universitario di Careggi, hanno operato dei pionieri della ricerca e della clinica del dolore. Da una parte il professor Federigo Sicuteri all'inizio anni '50 fondò il primo Centro Cefalee in Italia e

in Europa (il secondo al mondo dopo quello di Harold Wolff ad Harvard, negli Usa), e dell'altra il professor Paolo Procacci creatore del Centro di Terapia del Dolore e cofondatore insieme a John Bonica della International Association for the Study of Pain, che tenne il suo primo congresso nel 1975 proprio a Firenze. Il professor Paolo Procacci insieme ad altri clinici e ricercatori fondò nel 1976 l'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore, di cui è stato il primo presidente.

«L'obiettivo della medicina moderna - ha sottolineato Pierangelo Geppetti, presidente del Comitato Scientifico del congresso e professore emerito di Farmacologia Clinica all'Università di Firenze - è trasformare la gestione del dolore in un ambito di medicina di precisione, capace di personalizzare gli interventi terapeutici in base ai profili biologici e funzionali di ciascun paziente.»

La terapia farmacologica del dolore, in molti casi si avvale ancora di alcuni farmaci scoperti nell'800 come la morfina, il paracetamolo o

l'aspirina. A questi, nel corso degli anni se ne sono aggiunti molti altri, sempre più sofisticati. Le novità più rilevanti riguardano la suzetrigina, primo analgesico non oppioide approvato negli Stati Uniti negli ultimi vent'anni per il dolore post-operatorio, e la ciclobenzadrina sublinguale, recentemente autorizzata per il trattamento della fibromialgia. Importanti prospettive emergono anche dalla ricerca genetica: la scoperta del gene SLC45A4, associato a una maggiore sensibilità dolorifica, apre la strada a strategie mirate di modulazione dei nocicettori.

L'Italia continua a ricoprire un ruolo di primo piano nello studio dell'emicrania, grazie ai risultati ottenuti sul CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide), target dei più efficaci anticorpi monoclonali e piccole molecole attualmente in uso clinico.

Accanto ai farmaci, la terapia del dolore entra nell'era high-tech. «Le conoscenze oggi a nostra disposizione – spiega il professor Giustino Varrassi, presidente del Comitato Organizzatore di 'Pain Medicine' e presidente della Fondazione Paolo Procacci – sono infinitamente superiori a quelle che avevamo 50 anni fa. Oserei affermare, in modo forse più sentimentale che scientifico, che, nell'ambito della medicina del dolore, il progresso scientifico è stato di molto superiore a quello registrato in tanti altri campi della medicina. E nel corso dei prossimi anni, avremo a disposizione soluzioni terapeutiche sempre più innovative, anche grazie all'introduzione delle nuove tecnologie (intelligenza artificiale, bioingegneria, sensori indossabili e altro).

Le tecnologie digitali e la bioingegneria stanno ridefinendo l'approccio terapeutico.

L'intelligenza artificiale consente oggi di inte-



Da sinistra:
Giuseppe Caracciolo, Giustino Varrassi e Pierangelo Geppetti.

grare dati clinici, strumentali e da dispositivi indossabili, migliorando la diagnosi e la predittività dei trattamenti. La realtà virtuale, i neurostimolatori, gli esoscheletri robotici e le piattaforme di tele-riabilitazione rappresentano strumenti sempre più diffusi nei protocolli multimodali per il dolore cronico e neuropatico.»

L'obiettivo futuro, spiegano gli esperti, è lo sviluppo dei digital twins, modelli virtuali del corpo umano che permetteranno di simulare e ottimizzare le terapie prima della loro applicazione reale.

La ricerca di frontiera si concentra inoltre sul ruolo delle cellule di Schwann nella sensibilizzazione dei nocicettori e sulle interazioni tra sistema immunitario e dolore, con l'identificazione di nuovi target molecolari.

Il congresso, patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze, dall'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore e dalle principali società scientifiche internazionali, ha rappresentato sicuramente una tappa fondamentale nella lunga storia della medicina del dolore: una disciplina sempre più integrata, multidimensionale e tecnologicamente avanzata, che guarda a un obiettivo ambizioso ma realistico: rendere il dolore una condizione curabile, non più inevitabile.



Le riflessioni di un partecipante al Congresso IASP 1975 e al Congresso del Cinquantennale



Congresso IASP 1975. John Bonica al microfono, Paolo Procacci ultimo a destra

Nell'ormai lontano 1975 feci parte del comitato organizzatore locale del "First World Congress on Pain" della International Association for the Study of Pain (IASP), che il Prof. John Bonica aveva fondato due anni prima con l'intento di riunire in una società scientifica tutti gli studiosi che nel mondo dedicavano la loro attività alla ricerca sul dolore nei diversi campi di indagine, dalla fisiologia alla farmacologia alle diverse

discipline cliniche, in una fondamentale collaborazione di carattere interdisciplinare. In occasione della fondazione della IASP, fu deciso che l'associazione avrebbe organizzato un congresso mondiale sul dolore ogni tre anni e che il primo di tali congressi si sarebbe svolto nel 1975 a Firenze; l'incarico di organizzare questo congresso fu dato al Prof. Paolo Procacci, che svolgeva la propria attività nella Clinica Medica dell'Università

di Firenze. Si deve rilevare che a Firenze esisteva una tradizione di studi sul dolore nell'ambito della Medicina Interna: nella Clinica Medica erano presenti il Centro Cefalee, fondato e diretto dal Prof. Federigo Sicuteri, e il Centro di Algologia, fondato e diretto dal Prof. Procacci.

Al congresso, che si svolse dal 5 all'8 settembre 1975, convennero moltissimi partecipanti, in numero ampiamente superiore rispetto alle previsioni (e questo provocò anche alcuni problemi organizzativi, per fortuna rapidamente superati). Durante i lavori congressuali ebbi la possibilità di apprezzare l'elevato livello scientifico delle relazioni presentate e fui colpito dal vivo interesse con il quale l'uditorio seguiva le relazioni e partecipava alle discussioni; avevo l'impressione di percepire l'entusiasmo e la gioia degli studiosi provenienti da tante

parti del mondo che avevano la possibilità di incontrarsi e discutere i problemi concernenti il dolore.

Sono molto grato al Prof. Giustino Varrassi che mi ha invitato a partecipare al Congresso "*Pain Medicine. A long journey*", che si è svolto a Firenze il 12 e 13 settembre 2025 nel 50° anniversario del primo congresso della IASP. Ho avuto il piacere di incontrare nuovamente il Prof. John Loeser e il Prof. Giancarlo Carli, che avevano partecipato al congresso del 1975, ho potuto seguire l'intervento del Prof. Loeser, il quale ha rievocato gli avvenimenti che portarono alla fondazione della *IASP*, e ho avuto la possibilità di ricordare la figura del Prof. Procacci, che tanto ha contribuito alle attività dell'associazione internazionale, nella quale ha ricoperto le cariche di vice-presidente e di membro del Council, e alle attività del chapter italiano della *IASP*, cioè della Associazione Italiana per lo Studio del Dolore (AISD), nella quale è stato il primo presidente e successivamente vice-presidente e membro del Consiglio Direttivo. Alla memoria del Prof. Procacci



Giustino Varrassi



Luana Colloca



Michele Curatolo

sono particolarmente affezionato perché ho lavorato sotto la sua guida per più di 30 anni e mi è stato da lui concesso l'onore di contribuire ad alcune delle attività della *IASP* e dell'*AISD*.

I progressi della medicina del dolore

Il congresso del 1975 ha avuto una grande importanza perché ha rappresentato l'inizio di un periodo di intense

e fruttuose ricerche nel campo del dolore: è stato veramente il punto di partenza del *long journey* al quale fa riferimento il titolo del congresso del 2025. Le relazioni che sono state presentate in questo congresso da studiosi provenienti da tutte le parti del mondo mi hanno permesso di rendermi conto degli straordinari progressi che sono stati compiuti nei diversi campi di indagine rispetto a quelle che



Andrew Rice Presidente IASP

erano le conoscenze scientifiche nel 1975.

Alcune relazioni hanno colpito in particolare la mia attenzione. La relazione del Prof. Dickenson ha presentato un quadro dei processi di trasmissione e di elaborazione degli impulsi algogeni nel sistema nervoso centrale che appare di una complessità veramente enorme rispetto alle cognizioni che si avevano

nel 1975. Altre relazioni sono state dedicate ad alcuni argomenti che in anni recenti hanno destato grande interesse ma cinquanta anni or sono erano praticamente ignorati: il ruolo delle cellule della glia nella genesi del dolore, in particolare nella cefalea, è stato oggetto della relazione del Prof. Geppetti; l'importanza del sistema immunitario nei processi algogeni è stata

considerata nella relazione della Prof.ssa Malcangio e in quella del Prof. Ernfors; i possibili effetti della realtà virtuale su diversi aspetti del dolore sono stati esaminati nella relazione della Prof.ssa Colloca.

Poiché la mia attività si è svolta nell'ambito della medicina interna, ho seguito con particolare interesse le relazioni dedicate al dolore in reumatologia e in gastroenterologia: la relazione del Prof. Sarzi-Puttini sull'evoluzione dei concetti sul dolore nelle malattie reumatiche, quella del Prof. Ablin e quella del Prof. Truini sulla fibromialgia, quella del Prof. De Leon Casasola sul dolore nell'osteoartrosi, quella del Prof. Scarpignato sul dolore intestinale. La patogenesi della fibromialgia è stata ed è ancora oggetto di un grande numero di ricerche e di discussioni, come si è rilevato anche in questo congresso, ma nel 1975 non veniva considerata perché la fibromialgia non era stata ancora identificata come sindrome distinta da altre condizioni di dolore muscolare: è questo forse uno degli esempi più tipici della evoluzione che si è verificata negli ultimi 50 anni anche nella nosografia delle sindromi dolorose.

Certamente, come ha rilevato

in questo congresso il Prof. Cervero, la *IASP* ha dato un contributo fondamentale all'evoluzione delle conoscenze sul dolore. Ritengo che questo sia avvenuto principalmente attraverso due strumenti: i congressi mondiali e il giornale "*Pain*", organo ufficiale dell'associazione. Si deve ricordare che nel 1975, oltre all'organizzazione del primo congresso mondiale della *IASP*, ebbe anche inizio la pubblicazione del giornale "*Pain*", che nel corso degli ultimi 50 anni si è affermato come il più importante giornale scientifico sul dolore ed ha rappresentato un mezzo prezioso per la diffusione dei risultati delle nuove ricerche e per lo scambio di informazioni tra gli studiosi; anche in questo congresso, leggendo le indicazioni bibliografiche riportate nelle diapositive presentate dai relatori, ho potuto rilevare quante pubblicazioni di importanti ricerche siano comparse sul giornale "*Pain*". Credo che possiamo renderci conto di quale sia stata l'im-

portanza della *IASP* anche solo considerando quanto sia cambiata la tassonomia, principalmente per opera del *Subcommittee on taxonomy*, istituito nell'ambito dell'associazione proprio per uniformare le definizioni delle sindromi dolorose e i termini che ad esse si riferiscono. Nel 1975 esisteva ancora una certa confusione in questo campo e si avvertiva la necessità di stabilire una nomenclatura comune che permettesse una migliore comunicazione fra i ricercatori. Termini come "allodinia", "sindrome dolorosa regionale complessa" e "dolore nociplastico", oggi di uso corrente, sono nati in seno alla *IASP*, sono stati presentati e definiti sul giornale "*Pain*" e per opera dei membri della *IASP* si sono diffusi nella comunità scientifica.

Il ruolo di IASP e di AISD

Il congresso del 1975 ha dato certamente un grande impulso alla diffusione della *IASP* nel mondo, ma ha avuto anche una particolare impor-

tanza per l'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore. Lo statuto della *IASP* prevedeva l'istituzione di chapters, cioè di associazioni nazionali affiliate alla associazione internazionale: proprio durante il congresso del 1975 il Prof. Bonica affidò al Prof. Procacci il compito di provvedere alla fondazione di un *chapter* italiano. L'anno successivo il Prof. Procacci organizzò una riunione dei membri italiani della *IASP*, nella quale furono stabilite le caratteristiche dell'associazione nazionale, e provvide quindi alla fondazione con il necessario atto legale.

Nacque così l'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore AISD della quale l'anno prossimo avremo la gioia di celebrare i 50 anni di vita.

Marco Maresca

Socio fondatore AISD
Membro del Comitato Organizzatore del 1° Congresso IASP 1975 e del Comitato Organizzatore del Congresso "Pain Medicine. A long journey"



**IASP 2026 WORLD
CONGRESS ON PAIN**

Bangkok, Thailand • 26-30 October



10 OTTOBRE

Giornata mondiale della salute mentale

Comorbilità tra dolore cronico e disturbi mentali



Il 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale, iniziativa dell'OMS per celebrare i progressi in questo campo e sensibilizzare sulle future priorità in materia di salute mentale. Il tema di quest'anno è "Salute mentale nelle emergenze umanitarie", per sottolineare l'urgente necessità di garantire l'accesso ai servizi di salute mentale e di supporto psicosociale alle persone colpite da crisi come disastri naturali, conflitti, sfollamenti forzati o

altre emergenze. Tali emergenze spesso portano a perdite, traumi, disgregazione sociale e maggiore vulnerabilità; tutti meritano supporto, indipendentemente dalle circostanze.

Le crisi amplificano il disagio emotivo e la mancanza di un'assistenza tempestiva per la salute mentale può lasciare cicatrici durature non solo per i singoli individui, ma anche per le famiglie e le comunità. In contesti umanitari, una persona su cinque può sviluppare un disturbo di salute mentale e il supporto psico-sociale deve essere integrato nei sistemi di risposta alle emergenze.

Gli sforzi devono concentrarsi sulla garanzia che i servizi di salute mentale rimangano accessibili durante le emergenze, sia attraverso l'assistenza basata sulla comunità, interventi a distanza o team mobili di salute mentale. Non è sufficiente rispondere ai bisogni fisici. La salute mentale deve essere considerata una componente fondamentale dell'intervento di sanità pubblica in situazioni di crisi.

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale 2025, la European Pain Federation EFIC ha posto una forte enfasi sulla stretta interconnessione tra dolore cronico e disturbi mentali. Il Congresso EFIC 2025, tenutosi sul tema "Comorbidità tra dolore cronico e disturbi mentali: rompere il circolo vizioso", ha evidenziato questa relazione bidirezionale e l'importanza di un'assistenza integrata e multidisciplinare.

Attenzione al problema è stata data anche dall'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore con ampi spazi di discussione nei Congressi annuali e con la pubblicazione pochi anni fa di raccomandazioni per la gestione del dolore in pazienti con depressione.

Per l'iniziativa SIP Societal Impact of Pain affrontare il dolore e la salute mentale è sempre stato un obiettivo chiave. La Dichiarazione congiunta della SIP su dolore e salute mentale,

sviluppata in collaborazione con EFIC e Pain Alliance Europe, sollecita un'azione politica volta a trattare entrambi i temi all'unisono piuttosto che separatamente.

La SIP incoraggia i politici a:

- Integrare i servizi per il dolore e la salute mentale, anziché separarli nelle politiche e nella pratica
- Stanziare finanziamenti sufficienti per la ricerca su come il dolore e la salute mentale si influenzano a vicenda
- Fornire un accesso precoce ai programmi di gestione del dolore, in particolare per i pazienti a rischio di sviluppare dolore cronico e comorbidità mentale
- Formare gli operatori sanitari a riconoscere e gestire il peso sovrapposto del dolore e del disagio psicologico
- Coinvolgere persone con esperienza vissuta nella progettazione di servizi e politiche
- Affrontare lo stigma sia nel campo del dolore che in quello della salute mentale, anche tra gli operatori sanitari e nel dibattito pubblico
- Promuovere il reinserimento e l'adattamento delle persone che convivono con il dolore e/o con problemi di salute mentale nel mondo del lavoro, riconoscendo che condizioni di lavoro di supporto favoriscono il benessere.



10 October is World Mental Health Day

Mental health conditions and chronic pain frequently co-occur and influence each other, creating a vicious cycle of disability. Both pain and mental health conditions cause reduced quality of life, mobility and social participation across the lifespan.

Find out more:

www.europeanpainfederation.eu

15 OTTOBRE Giornata europea per la consapevolezza del dolore

Un'iniziativa dell'EFIC European Pain Federation

"La prevenzione del dolore cronico"



La sfida: una crisi di salute pubblica diffusa ma trascurata

Il dolore cronico, definito come dolore che dura più di tre mesi, colpisce 1 adulto su 5 in Europa, rendendolo la condizione di salute a lungo termine più diffusa nel continente. Colpisce tutte le fasce d'età e include dolore muscoloscheletrico, cefalea, dolore post-ope-

ratorio e condizioni neuropatiche. Il suo impatto è profondo e multidimensionale: limita gravemente la qualità della vita, favorisce la salute mentale e contribuisce alla mortalità prematura.

Il costo economico del dolore cronico è stimato in 12 miliardi di euro all'anno, pari al 4% del PIL, con perdite derivanti da spese sanitarie,

congedi per malattia di lunga durata, pensionamenti anticipati e riduzione della produttività. Rafforza inoltre le disuguaglianze sanitarie e sociali: il dolore cronico è più comune nelle donne, negli anziani e nei gruppi socioeconomicamente svantaggiati, eppure rimane ampiamente assente dalle strategie sanitarie nazionali, poco affrontato nella formazione medica e invisibile nelle politiche di prevenzione.

Perché la prevenzione è urgente e possibile

Nonostante l'entità del problema, il dolore cronico può essere prevenuto, ma questa opportunità non viene colta. Prevenire in questo contesto significa identificare e affrontare i fattori di rischio modificabili che aumentano la probabilità che il dolore acuto diventi cronico e invalidante. Questi includono scarsa attività fisica, scarsa qualità del sonno, stress e depressione, paura del dolore, mancanza di supporto sul posto di lavoro e accesso limitato a cure tempestive.

La prevenzione avviene a due livelli chiave

- La prevenzione primaria riduce innanzitutto il rischio di insorgenza di dolore cronico, promuovendo comportamenti sani e riducendo i fattori di rischio.

- La prevenzione secondaria garantisce la diagnosi precoce e interventi biopsicosociali tempestivi per coloro che sono a maggior rischio che il dolore diventi persistente o invalidante. Con l'invecchiamento della popolazione europea e l'aumento della multimorbilità, la prevenzione proattiva del dolore deve essere integrata nelle politiche di sanità pubblica, istruzione, occupazione e invecchiamento. Si tratta di un investimento nella resilienza, nella sostenibilità e nell'equità della società.

Ricerca sul dolore: una necessità strategica ed economica

Nonostante il suo impatto sociale, il dolore rimane uno dei settori meno finanziati nella ricerca sanitaria dell'UE. La strategia di ricerca europea dell'EFIC (2024) ha individuato lacune critiche che stanno compromettendo i progressi:

- mancanza di investimenti nella comprensione di come e perché il dolore diventa cronico, in particolare nei gruppi vulnerabili
- prove insufficienti su quali strategie di prevenzione funzionino, per chi e in quali contesti
- pochi studi che valutano il rapporto costo-efficacia e la scalabilità degli interventi nel mondo reale
- scarsa integrazione di innovazione digitale, strumenti di intelligenza artificiale e dati sanitari per la diagnosi precoce
- uso limitato di prospettive di genere e di equità nella scienza della prevenzione.

Aumentando i finanziamenti per la ricerca sul dolore incentrata sulla prevenzione, ad esempio Horizon Europe e programmi nazionali, i governi possono migliorare l'assistenza, ridurre la disabilità a lungo termine e rafforzare la sostenibilità del sistema sanitario. Il ritorno sull'investimento è evidente.

Raccomandazioni strategiche dell'EFIC

Per invertire la tendenza crescente del dolore cronico, la European Pain Federation) invita i governi nazionali a:

- Avviare campagne di sensibilizzazione pubblica per migliorare la comprensione del dolore, contrastare lo stigma e promuovere la ricerca precoce di aiuto.
- Promuovere programmi strutturati di movimento e formazione in ambito clinico, educativo e lavorativo.
- Garantire un accesso precoce alla riabilitazione biopsicosociale per le persone a rischio di cronicità.
- Stabilire standard di assistenza basati



sull'evidenza per ridurre i trattamenti inefficaci o dannosi.

- Rafforzare i sistemi di assistenza primaria per consentire una diagnosi precoce e il coordinamento delle cure.
- Sostenere politiche occupazionali inclusive che facilitino il mantenimento del posto di lavoro e il ritorno al lavoro.
- Investire nella ricerca sulla prevenzione, nell'infrastruttura dati e nelle strategie di attuazione.



La prima Giornata Mondiale contro il Dolore è stata organizzata nel 2004 dall'Associazione International Association on the Study of Pain (IASP) e dalla European Pain Federation (EFIC). L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) co-sponsorizzò la campagna, nata dagli sforzi collettivi di associazioni dedicate alla cura del dolore e a gruppi di sostegno che miravano ad affrontare l'impatto diffuso del dolore sugli individui e sulle società a livello mondiale. Nel corso degli anni, si è evoluta in una campagna di sensibilizzazione più ampia, caratterizzata da attività educative, campagne pubbliche e iniziative collaborative per migliorare la vita di chi soffre di dolore, come l'Anno mondiale contro il dolore promosso dalla IASP.

A partire dal 2024, la European Pain Federation ha istituito una "Giornata Europea per la Consapevolezza del Dolore" dedicata ad aumentare la comprensione e la consapevolezza del dolore cronico, una condizione che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Celebrata ogni anno il terzo mercoledì di ottobre, la Giornata Europea per la Consapevolezza del Dolore raccoglie l'impegno e l'interesse di operatori sanitari, ricercatori, responsabili politici, pazienti e il pubblico in generale.



Giornata europea per la consapevolezza sul dolore

Prevenzione del dolore cronico: promuovere un dialogo informato e il coinvolgimento del pubblico sulla realtà della malattia dolore

www.europeanpainfederation.eu



www.aisd.it



• 8 OTTOBRE 2025

Webinar congiunto AISD-GIMDO
Update sul dolore orofacciale
Patrocinio AISD

Il video del webinar è disponibile per i soci
nell'Area risorse educative del sito AISD
<https://www.aisd.it/documenti/area-risorse-educative>

• 10-11 OTTOBRE 2025

Giornate siciliane di algologia
Patrocinio AISD
[Aci Castello \(CT\)](#)

• 16 OTTOBRE 2025

Corso FAD: Verona Neuropathic Pain 2025
Inquadramento, fisiopatologia e clinica del
dolore neuropatico
Patrocinio AISD
[Verona](#)

• 17-18 OTTOBRE 2025

1° Congresso Regionale di Terapia del Dolore
"Pain Umbria"
Patrocinio AISD
[Spoleto](#)

• 18 OTTOBRE 2025

Excellence in Neuroinflammation
- First Meeting
[Abbazia di Praglia](#)

• 27-28 OTTOBRE 2025

Live surgery in terapia antalgica
V edizione 2025
Corso AISD
[Verona](#)

• 30 OTTOBRE 2025

Corso FAD: Verona Neuropathic Pain 2025
Comorbidità del dolore neuropatico
Patrocinio AISD

• 5 NOVEMBRE 2025

Why do placebo and nocebo effects matter?
Evento conclusivo del progetto PANACEA
[Bruxelles / streaming online](#)

• 7-8 NOVEMBRE 2025

XI CONGRESSO NAZIONALE
Vincere il Dolore Onlus
Patrocinio AISD
[Firenze](#)

• 13 NOVEMBRE 2025

Corso FAD: Verona Neuropathic Pain 2025
Diagnostica integrata del dolore neuropatico
Patrocinio AISD

• 20-22 NOVEMBRE 2025

XXXII Congresso Nazionale SICP Società
Italiana Cure Palliative
Patrocinio AISD
[Riccione](#)

• 22 NOVEMBRE - 15 DICEMBRE 2025

42° Congresso nazionale SIMG-Società
Italiana Medici di medicina generale
e delle cure primarie
Patrocinio AISD
[Sessioni virtuali](#)

• 27-29 NOVEMBRE 2025

42° Congresso nazionale SIMG-Società
Italiana Medici di medicina generale
e delle cure primarie
Patrocinio AISD
[Sessioni ibride](#)
[Firenze](#)

• 27 NOVEMBRE 2025

Corso FAD: Verona Neuropathic Pain 2025
Approccio terapeutico integrato
al dolore neuropatico
Patrocinio AISD



Dettagli e informazioni
nella pagina [Calendario eventi del sito](#)
<https://www.aisd.it>





La sezione Documenti del sito AISD si rinnova

Pubblicazioni

Video



AISD

AREA RISORSE EDUCATIVE



Questionari

Linee guida

Dalla nuova pagina **Area risorse educative** si può accedere alle registrazioni dei più recenti congressi, convegni e webinar promossi dall'AISD. Sono inoltre disponibili questionari di valutazione, poster informativi per i pazienti, un elenco delle principali campagne informative e di sensibilizzazione.

La sezione Pubblicazioni soci (lista delle pubblicazioni scientifiche cui i soci AISD hanno collaborato come primi autori o coautori) resta sempre in homepage, ma ora è consultabile anche dalla pagina **Area risorse educative**.



- ✓ Le sezioni **Linee guida**, **Raccomandazioni** e **Consigli di lettura** sono in aggiornamento, ma le abbiamo mantenute comunque disponibili.
- ✓ Non ultima, la sezione che riassume le caratteristiche essenziali del curriculum di medicina del dolore per i professionisti sanitari.
- ✓ Le sezioni sono consultabili da tutti, solo le sezioni video sono riservate ai soci, che possono accedervi dopo aver effettuato il login.
- ✓ Per suggerimenti utili ad arricchire le varie sezioni.
Scrivere a redazione@aisd.it



www.painnursing.it



GdS infermieristica

GRUPPO DI STUDIO AISD



INFERMIERISTICA DEL DOLORE



Pain Nursing Magazine
Italian Online Journal

EDITOR
ROBERTO LATINA

SENIOR EDITOR
GIUSTINO VARRASSI

SEE YOU IN **GLASGOW 2027** PAIN IN EUROPE **XV**



15TH CONGRESS OF THE
EUROPEAN PAIN FEDERATION EFIC®

21-23 APRIL 2027 | GLASGOW, SCOTLAND



[EFIC-CONGRESS.ORG](https://efic-congress.org) #EFIC2027

Roma Pain Days MAY [14-16, 2026]




FONDAZIONE
Paolo Procacci
FOUNDATION
Comprendere e curare il dolore
Understanding and caring pain

PRECISE HOUSE
Mantegna Hotel
Rome • Italy



www.aisd.it



Per donare il 5x1000
Codice Fiscale 80027230483

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL DOLORE

